ЛЕКЦИИ ПО АЛГЕБРЕ

3 СЕМЕСТР

2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

БУНИНА ЕЛЕНА ИГОРЕВНА

helenbunina@gmail.com

Часть 1 — ОСНОВЫ ТЕОРИИ ГРУПП

ЛЕКЦИЯ 1

ГРУППЫ.

ИЗОМОРФИЗМЫ ГРУПП.

ПРИМЕРЫ ГРУПП.

СТЕПЕНЬ ЭЛЕМЕНТА ГРУППЫ.

ГРУППА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Определение 1. Непустое множество G с бинарной операцией $*\colon G \times G \to G$, $(a, b) \to a * b \in G$ для $a, b \in G$, называется *группой*, если:

1) Операция ассоциативна (т. е. $(a * b) * c = a * (b * c)$ для всех $a, b, c \in G$);

2) Существует нейтральный элемент $e \in G$ (т. е. $g*e = g = e*g$ для всех $g \in G$);

3) Для каждого элемента $g \in G$ существует обратный элемент $g^{-1} \in G$ (т. е. $g * g^{-1} = e = g^{-1} * g$).

Замечание 1. Напомним, что нейтральный элемент (при мультипликативной записи называемый *единицей группы*) единственен.

Действительно, если e и e' — два нейтральных элемента в группе G, то $eg = g = ge$, $e'g = g = ge'$ для всех $g \in G$. Но тогда

$$e' = ee' = e.$$

Замечание 2. Обратный элемент g^{-1} для элемента $g \in G$ определен однозначно.

Действительно, если $f, h \in G$ — два обратных элемента для g, т. е. $fg = e = gf$, $hg = e = gh$, то $f = fe = f(gh) = (fg)h = eh = h$.

Лемма 1. *Если G — группа, $a, b, c \in G$, то*

1) *уравнение $ax = b$ имеет, и только одно, решение $x = a^{-1}b$;*

2) *уравнение $ya = b$ имеет, и только одно, решение $y = ba^{-1}$;*

3) *если $ab = ac$, то $b = c$; если $ba = ca$, то $b = c$;*

4) *уравнение $axb = c$ имеет единственное решение $x = a^{-1}cb^{-1}$;*

5) *если $x^2 = x$, то $x = e$;*

6) $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$; $(a_1 \dots a_n)^{-1} = a_n^{-1} \dots a_1^{-1}$; $(a^{-1})^{-1} = a$.

Доказательство. 1) Ясно, что $a(a^{-1}b) = b$. Если же $ax = b$ для $x \in G$, то $x = a^{-1}ax = a^{-1}b$.

2) Ясно, что $(ba^{-1})a = b$. Если же $ya = b$ для $y \in G$, то $y = (ya)a^{-1} = ba^{-1}$.

3), 4) и 5) следуют из 1) и 2).

6) проверяется непосредственно. □

ИЗОМОРФИЗМ ГРУПП

Хотя изоморфизм групп (как частный случай гомоморфизмов групп) будет детально исследован позднее, в то же время на начальном этапе рассмотрения групп крайне необходимо понимать, какие группы надо считать “одинаковыми”.

Определение 2. Пусть G и G' — группы. Отображение

$$\alpha\colon G \to G'$$

называется *изоморфизмом*, если:

1) $\alpha\colon G \to G'$ — биекция;

2) $\alpha(xy) = \alpha(x)\alpha(y)$ для всех элементов $x, y \in G$ (здесь: в левой части $xy \in G$ с операцией произведения группы G; в правой части $\alpha(x)\alpha(y) \in G'$ с операцией произведения группы G').

При этом говорят, что условие 2) означает, что биекция $\alpha\colon G \to G'$ согласована с операциями групп G и G'.

Символ $G_1 \cong G_2$ будет означать, что существует хотя бы один изоморфизм $\alpha\colon G_1 \to G_2$ между группами G_1 и G_2, при этом будем говорить, что группы G_1 и G_2 *изоморфны*, обозначение $G_1 \cong G_2$.

Замечание 3. Отношение $G_1 \cong G_2$ на классе групп является отношением эквивалентности:

1) $G \cong G$, поскольку тождественное отображение $1_G\colon G \to G$ — изоморфизм;

2) если $G_1 \cong G_2$ и $\alpha\colon G_1 \to G_2$ — изоморфизм, то $\alpha^{-1}\colon G_2 \to G_1$ — изоморфизм.

Действительно, для любых $u = \alpha(x),\ v = \alpha(y) \in G_2$, $x, y \in G_1$:

$$\alpha^{-1}(uv) = \alpha^{-1}\big(\alpha(x)\alpha(y)\big) = \\ = \alpha^{-1}\big(\alpha(xy)\big) = xy = \alpha^{-1}(u)\alpha^{-1}(v),$$

и поэтому $G_2 \cong G_1$;

3) если $G_1 \cong G_2$, $\alpha\colon G_1 \to G_2$ — изоморфизм, и $G_2 \cong G_3$, $\beta\colon G_2 \to G_3$ — изоморфизм, то $\beta\alpha\colon G_1 \to G_3$ — биекция, при этом для любых $x, y \in G_1$ имеем

$$(\beta\alpha)(xy) = \beta\big(\alpha(xy)\big) = \beta\big(\alpha(x)\alpha(y)\big) = \\ = \beta\big(\alpha(x)\big)\beta\big(\alpha(y)\big) = (\beta\alpha)(x)\beta\alpha(y),$$

и поэтому $\beta\alpha\colon G_1 \to G_3$ — изоморфизм групп, и следовательно, $G_1 \cong G_3$.

Из определения изоморфизма групп ясно, что любое свойство группы G, выраженное в ее мощности и ее групповой операции, также выполнено во всех группах G', изоморфных $G' \cong G$ группе G.

Пример 1. Следующие две группы G и G' изоморфны:

$$G = \{-1, 1\} = (\mathbf{U}(\mathbb{Z}), \cdot), \qquad \begin{array}{c|cc} & -1 & 1 \\ \hline -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{array}$$

и

$$G' = \{0, 1\} = (\mathbb{Z}_2, +), \qquad \begin{array}{c|cc} & 0 & 1 \\ \hline 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{array}.$$

Действительно, пусть $f\colon G \to G'$ — биекция, где $f(1) = 0$, $f(-1) = 1$. Так как

$$\begin{aligned} &f(1 \cdot 1) = f(1) = 0 = 0 + 0 = f(1) + f(1), \\ &f\big((-1) \cdot 1\big) = f(-1) = 1 = 1 + 0 = f(-1) + f(1), \\ &f\big((-1) \cdot (-1)\big) = f(1) = 0 = 1 + 1 = f(-1) + f(-1), \\ &f\big(1 \cdot (-1)\big) = f(-1) = 1 = 0 + 1 = f(1) + f(-1), \end{aligned}$$

то

$$f(x \cdot y) = f(x) + f(y)$$

для всех $x, y \in G$, таким образом, f — изоморфизм групп G и G'. $\square$

ПРИМЕРЫ ГРУПП

1. Целые числа $\mathbb{Z}$, рациональные числа $\mathbb{Q}$, действительные числа $\mathbb{R}$, комплексные числа $\mathbb{C}$ с операцией сложения, при этом никакие две из групп $(\mathbb{Z},+)$, $(\mathbb{Q},+)$, $(\mathbb{R},+)$ не являются изоморфными, однако $(\mathbb{R},+)\cong(\mathbb{C},+)$ (поскольку $\dim_{\mathbb{Q}}\mathbb{R}=\dim_{\mathbb{Q}}\mathbb{C}$).

Заметим, что: а) натуральные числа $\mathbb{N}$ с операцией сложения группой не являются (отсутствует нейтральный элемент); б) натуральные числа с нулем $\mathbb{N}_0$ также не являются группой (обратный элемент существует только для 0; таким образом, например, 1 уже не имеет обратного элемента).

2. $\mathbb{Q}^*=\mathbb{Q}\setminus\{0\}$, $\mathbb{R}^*=\mathbb{R}\setminus\{0\}$, $\mathbb{C}^*=\mathbb{C}\setminus\{0\}$ ($K^*=K\setminus\{0\}$ для любого поля K) относительно умножения являются группами (называемыми *мультипликативными группами* соответствующих *полей*).

3. Линейная группа $\mathrm{GL}_n(K)$ обратимых $(n\times n)$-матриц над полем K ($\mathrm{GL}_n(K)=\mathbf{U}\big(\mathbf{M}_n(K)\big)$, где $\mathbf{M}_n(K)$ — кольцо $(n\times n)$-матриц над полем K). Специальная линейная группа $\mathrm{SL}_n(K)$ матриц $A\in\mathbf{M}_n(K)$ таких, что $|A|=1$.

4. Группа комплексных чисел $z\in\mathbb{C}$ таких, что $|z|=1$, с операцией умножения. Группа $\{z\in\mathbb{C}\mid z^n=1\}$ комплексных корней n-й степени из 1, $n\in\mathbb{N}$.

5. Группа подстановок $\mathbf{S}_n$, $n\geq 1$; группа четных подстановок $\mathbf{A}_n$. Для произвольного непустого множества M группа $\mathbf{S}(M)$ всех *биекций* $f\colon M\to M$ с операцией умножения.

Замечание 4. Множество $\mathbf{T}(M)$ всех отображений $f\colon M \to M$ с операцией умножения (т. е. композицией) является *полугруппой* (т. е. множеством с ассоциативной бинарной операцией), но не является группой при $|M| > 1$ (существуют отображения $f\colon M \to M$, не являющиеся биекцией и, следовательно, не имеющие обратного отображения).

Замечание 5. Полугруппа $\mathbf{T}(M)$ коммутативна тогда и только тогда, когда $|M| = 1$. Действительно, если $|M| \geqslant 2$, то для $a, b \in M$, $a \neq b$, имеем

$$f_a f_b = f_a \neq f_b = f_b f_a,$$

где $f_c(x) = c$ для всех $x \in M$, $c \in M$.

Замечание 6. Группа $\mathbf{S}_n$ коммутативна тогда и только тогда, когда $n \leqslant 2$ (в частности, группы $\mathbf{S}_n$ при $n \geqslant 3$ уже некоммутативны). Действительно, при $n \geqslant 3$ для циклов $(1\,2)$, $(1\,3)$:

$$(1\,3)(1\,2) \neq (1\,2)(1\,3).$$

Замечание 7. Линейная группа $\mathrm{GL}_n(R)$ коммутативна тогда и только тогда, когда $n = 1$.

Действительно, при $n \geqslant 2$: $E + E_{12}, E + E_{21} \in \mathrm{GL}_n(R)$, но

$$(E + E_{12})(E + E_{21}) = E + E_{12} + E_{21} + E_{11} \neq$$
$$\neq E + E_{12} + E_{21} + E_{22} = (E + E_{21})(E + E_{12})).$$

6. Группа симметрий. Пусть V — евклидово аффинное пространство $\mathbb{R}^2$ или $\mathbb{R}^3$. Под *изометрией* пространства V понимается биекция $\alpha\colon V \to V$, сохраняющая расстояния (примеры: переносы; вращения; отражения). Если $\varnothing \neq X \subset V$, то будем говорить, что изометрия α является *симметрией* множества X, если $X = \alpha(X)$ $(= \{\alpha(x) \mid x \in X\})$, при этом возможно, что $x \neq \alpha(x)$. Совокупность $\mathrm{Sym}(X)$ всех симметрий α множества $\varnothing \neq X \subseteq V$ образует группу (*группа симметрий* $\mathrm{Sym}(X)$, подгруппа группы $\mathbf{S}(X)$).

а) Пусть T — правильный треугольник с вершинами A, B и C, с высотами-медианами L_A, L_B и L_C, с центром описанной окружности O.

Рассмотрим совокупность $\mathbf{D}_3$ симметрий правильного треугольника T (т. е. все сохраняющие расстояние отображения $f\colon P \to P$ плоскости $P = \mathbb{R}^2$ такие, что $f(T) = T$). С операцией композиции $\mathbf{D}_3$ — группа. Рассмотрим ее элементы:

- $e = 1_P$, $1_P(x) = x$ для всех $x \in P$;
- φ_1, φ_2 — два вращения плоскости P против часовой стрелки, соответственно на углы $120°$ и $240°$;
- θ_1, θ_2, θ_3 — три зеркальных отображения плоскости P, соответственно относительно прямых L_A, L_B, L_C.

Как результат, получаем таблицу умножения для группы $\mathbf{D}_3$:

	e	φ_1	φ_2	θ_1	θ_2	θ_3
e	e	φ_1	φ_2	θ_1	θ_2	θ_3
φ_1	φ_1	φ_2	e	θ_3	θ_1	θ_2
φ_2	φ_2	e	φ_1	θ_2	θ_3	θ_1
θ_1	θ_1	θ_2	θ_3	e	φ_1	φ_2
θ_2	θ_2	θ_3	θ_1	φ_2	e	φ_1
θ_3	θ_3	θ_1	θ_2	φ_1	φ_2	e

.

Если $S = \{1 = A,\ 2 = B,\ 3 = C\}$ — множество вершин правильного треугольника T, то каждому элементу группы $\mathbf{D}_3$ поставим в соответствие подстановку вершин треугольника T:

$$e \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad \varphi_1 \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad \varphi_2 \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix},$$
$$\theta_1 \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \quad \theta_2 \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad \theta_3 \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Можно проверить, что данная биекция осуществляет изоморфизм группы симметрий треугольника $\mathbf{D}_3$ и группы подстановок $\mathbf{S}_3$.

б) Пусть в данном примере T — квадрат в плоскости $P = \mathbb{R}^2$ с вершинами A, B, C, D, центром O, с серединами ребер E, F, G, K.

Рассмотрим группу симметрий $\mathbf{D}_4$ квадрата $ABCD$. Она состоит: из четырех вращений на 0°, 90°, 180°, 270°; из четырех отражений относительно прямых L_{AC}, L_{BD}, L_{EG}, L_{KF}. Выпишите для группы $\mathbf{D}_4$, $|\mathbf{D}_4| = 8$, таблицу умножения.

Каждому элементу из $\mathbf{D}_4$ поставим в соответствие подстановку множества вершин $\{A = 1,\ B = 2,\ C = 3,\ D = 4\}$. Например, повороту на 90° соответствует подстановка

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}.$$

Эта биекция осуществляет вложение ($\equiv$ инъективный гомоморфизм) группы $\mathbf{D}_4$ в группу подстановок $\mathbf{S}_4$. Отметим, что $|\mathbf{D}_4| = 8$, $|\mathbf{S}_4| = 24$, поэтому не все подстановки из $\mathbf{S}_4$ лежат в образе этой биекции. Например, подстановка

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

не является результатом никакой симметрии квадрата.

7. Группа симметрий правильного n-угольника (диэдральная группа $\mathbf{D}_n$ порядка $2n$) состоит: из n поворотов правильного n-угольника против часовой стрелки вокруг его центра (включая тождественное отображение); из n отражений относительно оси симметрии (если n нечетное, то ось отражения определяется вершиной и серединой противоположного ребра; если n четное, то имеется два типа отражений, определяемых парой противоположных вершин и определяемых серединами противоположных ребер, $(1/2)\,n + (1/2)\,n = n$).

8. Пусть X — непустое множество, $\mathcal{P}(X)$ — совокупность всех его подмножеств (включая пустое),

$$S \,\triangle\, T = (S \cup T) - (S \cap T)$$

для $S, T \in \mathcal{P}(X)$. Тогда $(\mathcal{P}(X), \triangle)$ — коммутативная группа.

Упражнение 1. Найдите $|\,\mathrm{GL}_n(\mathbb{Z}_p)|$ и $|\,\mathrm{SL}_n(\mathbb{Z}_p)|$.

Упражнение 2. Докажите, что если в группе G $(xy)^2 = x^2y^2$ для всех $x, y \in G$, то группа G коммутативна.

Упражнение 3. Если для любых элементов x, y группы G найдется число n такое, что $(xy)^i = x^iy^i$ для $i = n, n+1, n+2$, то группа G коммутативна.

9. Группа Клейна. Пусть

$G = \{e,\ a = (1\,2)(3\,4),\ b = (1\,3)(2\,4),\ c = (1\,4)(2\,3)\} \subseteq \mathbf{S}_n,\ n \geqslant 4,$ — *группа Клейна* $\mathbf{V}_4$ (*четверная группа*). Ее таблица умножения:

	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	e	a
c	c	b	a	e

.

10. *Группа кватернионов* $\mathbf{Q}_8$ состоит из восьми матриц из $\mathbf{M}_4(\mathbb{R})$: $\pm E$, $\pm i$, $\pm j$, $\pm k$, где

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad i = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

$$j = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad k = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

с операцией умножения матриц. Отметим, что:

$$i^2 = j^2 = k^2 = -E, \quad ij = k.$$