

О.В. Маркова

**Конспект спецкурса  
“Алгебраические основы теории  
кодов и линейных рекуррентных  
последовательностей”**

Версия от *16 апреля 2026г.*

# Содержание

Лекция 1. Основные параметры кодов: размерность, расстояние Хэмминга, исправление ошибок. Линейные коды. Граница Синглтона. МДР-коды, их свойства. Граница Хэмминга (граница сферической упаковки). Совершенные коды. Двоичный код Хэмминга. Граница Плоткина. Эквидистантные коды. Симплексный код. . . . .	4
Лекция 2. Изометрические преобразования пространства Хэмминга. Теорема А.А. Маркова. . . . .	13
Лекция 3. Реальная длина кода. Теорема Мак-Вильямс о продолжении изометрий линейных кодов. . . . .	19
Лекция 4. Проверочная и порождающая матрицы, гарантируемый ранг и расстояние линейного кода над полем. Проверочная и порождающая матрицы в стандартной форме. Двойственный код, его проверочная и порождающая матрицы. Коды, двойственные к двоичному коду Хэмминга и к обобщённому коду Рида–Соломона. . . . .	26
Лекция 5. Построение новых кодов из заданных. Граница Грайсера. . . . .	35
Лекция 6. Основные понятия теории колец. Локальные кольца, эквивалентные определения. Разложение конечного коммутативного кольца в прямую сумму локальных колец. Аннуляторы идеала в модуле и подмодуля в кольце. Лемма Накаямы. Радикал Джекобсона конечного коммутативного кольца и цоколь модуля, связь между ними. Системы образующих модуля. . . . .	44
Лекция 7. Модуль характеров конечного модуля. Инъективные модули. Критерий Бэра. Инъективность модуля характеров. Квазифробениусов модуль, существование и единственность с точностью до изоморфизма. . . . .	55
Лекция 8. Характеризация квазифробениусовых модулей с помощью различающих характеров. Линейные коды над квазифробениусовым модулем, двойственность между кодами над кольцом и кодами над квазифробениусовым модулем. . . . .	63

Лекция 9. Общая весовая функция линейного кода над кольцом и над модулем. Тожество Мак-Вильямс для линейных кодов над кольцом и над квазифробениусовым модулем. Пространство последовательностей над кольцом как модуль над кольцом многочленов. Линейные рекуррентные последовательности (ЛРП). Характеристический многочлен ЛРП. Порождающие элементы модуля ЛРП. Импульсная последовательность. Генератор ЛРП. Минимальный многочлен ЛРП над полем и его свойства. Аннулятор ЛРП. . . . . 70

**Лекция 1. Основные параметры кодов: размерность, расстояние Хэмминга, исправление ошибок. Линейные коды. Граница Синглтона. МДР-коды, их свойства. Граница Хэмминга (граница сферической упаковки). Совершенные коды. Двоичный код Хэмминга. Граница Плоткина. Эквидистантные коды. Симплексный код.**

Под *кольцом* в нашем курсе будет пониматься конечное ассоциативное, коммутативное кольцо с единицей, т.е. конечное множество  $(\mathcal{R}, +, \cdot)$  с двумя бинарными операциями (для удобства их называют сложением и умножением), удовлетворяющими следующим аксиомам:

- 1)  $(\mathcal{R}, +)$  — абелева группа с нейтральным элементом 0 (аддитивная группа кольца);
- 2) выполнены тождества *дистрибутивности*:

$$\forall a, b, c \in \mathcal{R}, \quad a(b + c) = ab + ac, \quad (a + b)c = ac + bc;$$

- 3)  $(\mathcal{R}, \cdot)$  — полугруппа, т.е. операция  $\cdot$  ассоциативна;
- 4) в  $\mathcal{R}$  имеется нейтральный относительно умножения элемент 1 (или  $e$ , или  $1_R$ , когда приходится говорить одновременно о разных кольцах);
- 5)  $\forall a, b, c \in \mathcal{R}, \quad ab = ba$ , т.е. операция  $\cdot$  коммутативна.

**Определение 1.1.** *Правым модулем* над кольцом  $\mathcal{R}$ , или *правым  $\mathcal{R}$ -модулем*, называется абелева группа  $(M, +)$  с определёнными на ней операциями умножения справа на элементы кольца  $\mathcal{R}$ , которые удовлетворяют тождествам

$$a(rs) = (ar)s, \quad (a + b)r = ar + br, \quad a(r + s) = ar + as, \quad a \cdot 1 = a$$

для всех  $a, b \in M, r, s \in \mathcal{R}$ .

Аналогично можно определить левый  $\mathcal{R}$ -модуль.

**Определение 1.2.** *Подмодуль* произвольного модуля  $M$  — это его подмножество, содержащее 0 и замкнутое относительно операций сложения, взятия противоположного элемента и умножения на элементы кольца.

**Определение 1.3.** Внешняя *прямая сумма*  $M_1 \oplus \dots \oplus M_n$   $\mathcal{R}$ -модулей  $M_1, \dots, M_n$  — множество всех строк  $(m_1, \dots, m_n)$ , где  $m_i \in$

$M_i \forall i \in \{1, \dots, n\}$ , с покомпонентными сложением и умножением на элементы кольца  $\mathcal{R}$ .

В частности, если  $M_1 = \dots = M_n = M$  мы будем рассматривать  $\mathcal{R}$  модуль  $M^n$  строк длины  $n$ .

**Определение 1.4.** Отображение  $f : M \rightarrow N$  правых модулей над кольцом  $\mathcal{R}$  называется *гомоморфизмом*, если

$$\forall a, b \in M, r \in \mathcal{R}, f(a + b) = f(a) + f(b), f(ar) = f(a)r.$$

Гомоморфизм модулей называется *изоморфизмом*, если он является биективным отображением. Изоморфизм модуля в себя называется *автоморфизмом*.

## 1°. Основные параметры кодов: размерность, расстояние Хэмминга, исправление ошибок. Линейные коды.

**Определение 1.5.** Пусть  $\Omega$  — некоторое конечное множество,  $|\Omega| > 1$ , — *алфавит*. Пусть  $n$  — натуральное число,  $\Omega^n$  — декартова степень множества  $\Omega$ . Элементы множества  $\Omega^n$  будем называть *словами длины  $n$*  в алфавите  $\Omega$ .

**Определение 1.6.** *Расстоянием Хэмминга* между словами  $\mathbf{a} = (a_1, \dots, a_n)$  и  $\mathbf{b} = (b_1, \dots, b_n)$  из  $\Omega^n$  назовём число

$$d(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = |\{i : 1 \leq i \leq n \ \& \ a_i \neq b_i\}|.$$

Нетрудно проверить, что  $(\Omega^n, d)$  — метрическое пространство, которое и называется *пространством Хэмминга*.

**Определение 1.7.** Произвольное непустое подмножество  $\mathcal{C}$  пространства  $\Omega^n$  называется *кодом длины  $n$*  над алфавитом  $\Omega$ .

**Определение 1.8.** *Размерностью* (более точно, *комбинаторной размерностью*) кода  $\mathcal{C}$  называется действительное число  $\dim(\mathcal{C}) = \log_q |\mathcal{C}|$ , где  $q = |\Omega|$ .

**Определение 1.9.** *Расстоянием* (точнее, *минимальным расстоянием*) кода  $\mathcal{C}$  при  $|\mathcal{C}| > 1$  называется число

$$d(\mathcal{C}) = \min\{d(\mathbf{a}, \mathbf{b}) : \mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathcal{C} \ \& \ \mathbf{a} \neq \mathbf{b}\},$$

расстояние кода из одного слова можно считать равным 0.

Если код  $\mathcal{C}$  над алфавитом мощности  $q$  имеет длину  $n$ , размерность  $k$  и расстояние  $d$ , говорят, что  $\mathcal{C}$  есть  $[n, k, d]_q$ -код. Некоторые из этих параметров можем опускать, если они неизвестны или несущественны.

Передачу информации по каналу связи можно описать следующим образом:

слово  $w$   $\xrightarrow{\text{канал связи}}$  слово  $w'$ .

Если  $w' \neq w$ , говорят, что при передаче данных произошла ошибка. В простейшем случае можно считать, что искажения любых двух символов — равновероятные независимые события. Желательно, чтобы приёмник мог обнаруживать и, по возможности, исправлять слово  $w'$ , получая исходное слово  $w$ .

Для этого применяют процесс кодирования/декодирования, который можно описать так.

Пусть  $M$  — известное множество входных слов (как правило,  $M = \Omega^k$  для некоторого натурального числа  $k$ ). Выбирается некоторое инъективное отображение (кодирование)  $\varphi : M \rightarrow \Omega^n$ , где  $\mathcal{C} = \varphi(M)$  — некоторый известный код. Допустим, надо передать слово  $m$ . Вместо него по каналу связи передаётся слово  $w = \varphi(m)$  и полученное слово  $w'$  проверяется на принадлежность коду  $\mathcal{C}$ . Если  $w' \in \mathcal{C}$ , считается, что передано (однозначно определённое) слово  $\varphi^{-1}(w')$ . Если же  $w' \notin \mathcal{C}$ , выбирается ближайшее (в смысле Хэмминга) к  $w'$  слово  $w'' \in \mathcal{C}$ . Если такое слово определено однозначно, предполагается, что передано слово  $\varphi^{-1}(w'')$  (*принцип максимального правдоподобия*). Если же на минимальном расстоянии от слова  $w'$  находится несколько слов, принадлежащих коду  $\mathcal{C}$ , то фиксируется ошибка, которую невозможно исправить.

**Теорема 1.10.** Пусть  $d$  — расстояние Хэмминга кода  $\mathcal{C}$ ,  $2r < d$  и  $s < d$ . Тогда код  $\mathcal{C}$  обнаруживает  $s$  ошибок и исправляет  $r$  ошибок.

◀ Очевидно, что если  $m \in M$ ,  $d(w', \varphi(m)) = s < d(\mathcal{C})$  и  $w' \in \mathcal{C}$ , то  $w' = \varphi(m)$ . Заметим, что для любого слова  $a \in \Omega^n$  существует не более одного слова  $c \in \mathcal{C}$ , для которого выполнено неравенство  $d(a, c) \leq r$ . Действительно, пусть  $c_1, c_2 \in \mathcal{C}$ ,  $d(a, c_1) \leq r$  и  $d(a, c_2) \leq r$ . Тогда  $d(c_1, c_2) \leq d(c_1, a) + d(a, c_2) \leq 2r < d$ , откуда  $c_1 = c_2$ . Поскольку, по предположению,  $d(w', \varphi(m)) = r$  и  $\varphi(m) \in \mathcal{C}$ , получаем, что  $w'' = \varphi(m)$  и  $\varphi^{-1}(w'') = m$ . ▶

*Примеры.*

1. Повторение слова. Если любое слово  $w = (w_1, \dots, w_k)$  кодировать словом  $(w|w) = (w_1, \dots, w_k, w_1, \dots, w_k)$ , то получается  $[2k, k, 2]$ -код. Видно, что он обнаруживает одну ошибку и ни одной не исправляет, а объём передаваемой информации увеличивается вдвое.

2. Код проверки на чётность. Пусть на множестве  $\Omega$  задана групповая операция “+” (не обязательно коммутативная). Тогда слово  $w = (w_1, \dots, w_k)$  можно кодировать словом  $(w_1, \dots, w_k, -(w_k + \dots + w_1))$ . Тогда получится  $[k + 1, k, 2]$ -код, но скорость передачи информации (т.е. отношение  $k/n$ ) у кода проверки на чётность выше, чем у кода удвоения.

**Определение 1.11.** Пусть  $M$  — конечный правый или левый модуль над кольцом  $\mathcal{R}$ ,  $|M| \geq 2$ . *Линейным кодом длины  $n$*  над модулем  $M$  называется произвольный подмодуль  $\mathcal{R}$ -модуля  $M^n$ .

Основные частные случаи:

$M = \mathcal{R}_{\mathcal{R}}$  или  $M = {}_{\mathcal{R}}\mathcal{R}$  — говорят о коде над кольцом  $\mathcal{R}$ .

$M = \mathcal{R}$ , где  $\mathcal{R} = \mathbb{F}$ ,  $\mathbb{F}$  — конечное поле. В этом случае говорят о линейных кодах над полем  $\mathbb{F}$ .

*Примеры.* Почти все коды, которые мы построим в данной лекции — линейные коды над полем (двоичный код Хэмминга, обобщённый код Рида-Соломона, симплексный код).

**Определение 1.12.** Пусть  $M$  — конечный модуль. Назовём *весом* слова  $\mathbf{a} = (a_1, \dots, a_n) \in M^n$  число

$$\|\mathbf{a}\| = |\{i : 1 \leq i \leq n \ \& \ a_i \neq 0\}|.$$

Очевидны следующие соотношения:

- 1)  $\forall \mathbf{a}, \mathbf{b} \in M^n : d(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \|\mathbf{a} - \mathbf{b}\|$ ;
- 2)  $\forall \mathcal{C} \leq M^n : d(\mathcal{C}) = \min\{\|\mathbf{a}\| : \mathbf{a} \in \mathcal{C} \setminus \{0\}\}$ .

## 2°. Граница Синглтона. МДР-коды, их свойства.

**Теорема 1.13** (Граница Синглтона). Если  $\mathcal{C}$  есть  $[n, k, d]$ -код, то

$$d \leq n - k + 1. \tag{1.1}$$

◀ Пусть  $m = |\mathcal{C}|$ . Перенумеруем все слова кода  $\mathcal{C}$ :  $\mathbf{a}_i = (a_{i1}, \dots, a_{in})$ ,  $1 \leq i \leq m$ . Составим из них матрицу, в которой выделим первые  $d - 1$  столбцов:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} = \left( \begin{array}{ccc|ccc} a_{11} & \dots & a_{1,d-1} & a_{1d} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & \dots & a_{m,d-1} & a_{md} & \dots & a_{mn} \end{array} \right)$$

Поскольку  $d(\mathcal{C}) = d$ , то в выделенной группе последних  $n - d + 1$  столбцов этой матрицы любые две строки различны. Следовательно, количество кодовых слов не превосходит количества различных строк длины  $n - d + 1$  в алфавите  $\Omega$ , т.е.  $m \leq q^{n-d+1}$ , где  $q = |\Omega|$ . Логарифмируя по основанию  $q$ , получаем требуемую оценку. ►

**Определение 1.14.** Код  $\mathcal{C}$  называется *кодом с максимально достижимым расстоянием*, или *МДР-кодом*, если  $\mathcal{C}$  есть  $[n, k, n - k + 1]$ -код, т.е. неравенство (1.1) обращается в равенство.

Тривиальными примерами МДР-кодов являются:

- $[n, n, 1]$ -код  $\Omega^n$ ;
- $[n, 1, n]$ -код констант  $\mathcal{C} = \{(a, \dots, a) \in \Omega^n\}$ ;
- $[n, n - 1, 2]$ -код проверки на чётность.

*Пример.* Пусть  $\mathbb{F}$  — конечное поле,  $q = |\mathbb{F}|$ ,  $M = \mathbb{F}[x|k] = \{f(x) \in \mathbb{F}[x] : \deg f(x) < k\}$ ,  $x_1, \dots, x_n$  — различные элементы поля  $\mathbb{F}$ , где  $n \geq k$ .  $u_1, \dots, u_n$  — обратимые элементы  $\mathbb{F}$ , отображение  $\varphi : \mathbb{F}[x|k] \rightarrow \mathbb{F}^n$  задано правилом

$$\varphi(f(x)) = (u_1 f(x_1), \dots, u_n f(x_n)).$$

Образ  $\varphi(\mathbb{F}[x|k])$  называется *обобщённым  $[n, k]$ -кодом Рида–Соломона* над полем  $\mathbb{F}$  и даёт менее тривиальный пример МДР-кода.

**Предложение 1.15.** Обобщённый  $[n, k]$ -код Рида–Соломона является МДР-кодом.

◀ Если  $f(x) \in \mathbb{F}[x|k]$  и  $f(x) \neq 0$ , то по теореме Безу число корней многочлена  $f(x)$  среди  $x_1, \dots, x_n$ , равное  $n - d(\varphi(f(x)), 0)$ , удовлетворяет также неравенству  $n - d(\varphi(f(x)), 0) \leq \deg(f(x)) < k$ , откуда  $d(\varphi(f(x)), 0) > n - k$ . Во-первых, отсюда видно, что  $\ker \varphi = 0$ , поэтому  $\dim \varphi(\mathbb{F}[x|k]) = \dim \mathbb{F}[x|k] = k$ . Во-вторых, беря в качестве  $f(x)$  разность любых различных многочленов из  $\mathbb{F}[x|k]$ , убеждаемся, что расстояние  $d$  данного кода также удовлетворяет неравенству  $d > n - k$ , что, в силу границы Синглтона, возможно лишь при  $d = n - k + 1$ . ►

**3°. Граница Хэмминга (граница сферической упаковки). Совершенные коды. Двоичный код Хэмминга.**

**Теорема 1.16** (Граница Хэмминга, или граница сферической упаковки). Пусть  $\mathcal{C}$  есть  $[n, k, d]_q$ -код над алфавитом  $\Omega$  и  $d > 2r$ . Тогда

$$q^k \leq \frac{q^n}{s_q(n, r)}, \text{ где } s_q(n, r) = \sum_{i=0}^r (q-1)^i \binom{n}{i}. \quad (1.2)$$

◀ Нетрудно видеть, что  $i$ -е слагаемое в  $s_q(n, r)$  — число точек пространства  $\Omega^n$ , лежащих на расстоянии  $i$  от произвольной фиксированной точки  $\mathbf{a}$  этого пространства, поэтому  $s_q(n, r) = |O_r(\mathbf{a})|$ , где

$$O_r(\mathbf{a}) = \{\mathbf{b} \in \Omega^n : d(\mathbf{a}, \mathbf{b}) \leq r\}.$$

В силу неравенства треугольника  $O_r(\mathbf{a}) \cap O_r(\mathbf{a}') = \emptyset$  при  $\mathbf{a}, \mathbf{a}' \in \mathcal{C}$  и  $\mathbf{a} \neq \mathbf{a}'$ , следовательно,

$$q^k s_q(n, r) = |\mathcal{C}| s_q(n, r) = \left| \bigcup_{\mathbf{a} \in \mathcal{C}} O_r(\mathbf{a}) \right| \leq |\Omega^n| = q^n.$$

►

**Определение 1.17.** Код  $\mathcal{C}$  называется *совершенным*, если неравенство в (1.2) обращается в равенство (при этом обязательно  $d = 2r + 1$ ).

*Пример.* Двоичный код Хэмминга  $\mathcal{H}_2(l)$  длины  $n = 2^l - 1$  — множество слов  $a \in \mathbb{Z}_2^n$ , удовлетворяющих условию  $Ha^T = 0$ , где  $H$  — матрица, столбцы которой — все ненулевые столбцы длины  $l$  над  $\mathbb{Z}_2$ .

**Предложение 1.18.** Двоичный код Хэмминга  $\mathcal{H}_2(l)$  является линейным  $[n, n - l, 3]_2$  совершенным кодом.

◀ Линейность очевидна по построению. Поскольку матрица  $H$  содержит все ненулевые столбцы высоты  $l$ , то  $\text{rk} H = l$ , откуда  $\dim \mathcal{H}_2(l) = n - l$ .

Так как матрица  $H$  не содержит нулевого столбца и любые два её столбца различны, то никакое ненулевое слово веса  $\leq 2$  не удовлетворяет условию  $Ha^T = 0$ , значит,  $d(\mathcal{H}_2(l)) \geq 3$ . С другой стороны, матрица  $H$  содержит столбцы  $\mathbf{e}_1^T$ ,  $\mathbf{e}_2^T$ ,  $\mathbf{e}_1^T + \mathbf{e}_2^T$  (здесь  $\mathbf{e}_s^T = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)^T$  — столбец с единицей на  $s$ -ом месте), поэтому код  $\mathcal{H}_2(l)$  содержит слово веса 3 и  $d(\mathcal{H}_2(l)) = 3$ .

В равенстве (1.2) для  $d = 3$  имеем  $r = 1$ ,  $k = n - l$ ,  $s_2(n, 1) = \sum_{i=0}^1 (2-1)^i \binom{n}{i} = 1 + n = 1 + (2^l - 1) = 2^l$ , поэтому  $2^{n-l} = \frac{2^n}{s_2(n, 1)}$  и

код  $\mathcal{H}_2(l)$  является совершенным. ►

#### 4°. Граница Плоткина. Эквидистантные коды. Симплексный код.

**Теорема 1.19** (Граница Плоткина). Пусть  $\mathcal{C}$  есть  $[n, k, d]_q$ -код. Тогда

$$d \leq \frac{nq^{k-1}(q-1)}{q^k-1} = \frac{q-1}{q} \frac{|\mathcal{C}|}{|\mathcal{C}|-1} n \quad (1.3)$$

◀ Пусть  $\mathcal{C} \subseteq \Omega^n$ , где  $|\Omega| = \{\omega_1, \dots, \omega_q\}$ ,  $M = |\mathcal{C}|$ . Обозначим через  $\pi_i$  проекцию  $\Omega^n$  на  $i$ -ю координату (т.е.  $\pi_i((a_1, \dots, a_n)) = a_i$  при  $i = 1, \dots, n$ ) и положим

$$m_{ij} = |\{\mathbf{a} \in \mathcal{C} : \pi_i(\mathbf{a}) = \omega_j\}| = \sum_{\mathbf{a} \in M} \delta_{\pi_i(\mathbf{a}), \omega_j}.$$

По определению, для любой пары  $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathcal{C}$  при  $\mathbf{a} \neq \mathbf{b}$  имеем  $d \leq d(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ . Суммируя по всем парам, получим

$$M(M-1)d \leq \sum_{\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathcal{C}} d(\mathbf{a}, \mathbf{b}). \quad (1.4)$$

С другой стороны,  $d(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \sum_{i=1}^n (1 - \delta_{\pi_i(\mathbf{a}), \pi_i(\mathbf{b})})$ . Таким образом, правую часть неравенства (1.4) можно переписать в виде

$$\begin{aligned} \sum_{\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathcal{C}} \sum_{i=1}^n (1 - \delta_{\pi_i(\mathbf{a}), \pi_i(\mathbf{b})}) &= nM^2 - \sum_{\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathcal{C}} \sum_{i=1}^n \delta_{\pi_i(\mathbf{a}), \pi_i(\mathbf{b})} = \\ &= nM^2 - \sum_{i=1}^n \sum_{\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathcal{C}} \sum_{\omega \in \Omega} \delta_{\pi_i(\mathbf{a}), \omega} \delta_{\pi_i(\mathbf{b}), \omega} = nM^2 - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^q m_{ij}^2. \end{aligned}$$

Теперь применим неравенство Коши–Буняковского к векторам  $(1, 1, \dots, 1)$  и  $(m_{i1}, m_{i2}, \dots, m_{iq})$ :

$$\left( \sum_{j=1}^q m_{ij} \right)^2 \leq q \sum_{j=1}^q m_{ij}^2.$$

При каждом  $i = 1, \dots, n$ ,  $\sum_{j=1}^q m_{ij} = M$ , поэтому

$$M(M-1)d \leq nM^2 - n/qM^2 = nM^2 \frac{q-1}{q}.$$



Если неравенство (1.3) обращается в равенство, говорят, что код лежит на границе Плоткина. Как видно из доказательства теоремы 1.19, необходимым (но не достаточным!) условием этого является эквидистантность кода в смысле следующего определения.

**Определение 1.20.** Код  $\mathcal{C}$  называется *эквидистантным*, если все расстояния между различными словами кода  $\mathcal{C}$  одинаковы.

Очевидным примером эквидистантного кода является уже упомянутый код констант. Более сложно устроен следующий

*Пример.* Пусть  $\mathbb{F}$  — конечное поле,  $|\mathbb{F}| = q$ ,  $V$  — линейное пространство над  $\mathbb{F}$ ,  $k = \dim_{\mathbb{F}} V$ . Положим  $n = q^k - 1$  и как-нибудь занумеруем ненулевые векторы пространства  $V$ :

$$V \setminus \{0\} = \{v_1, \dots, v_n\}.$$

Рассмотрим далее сопряжённое пространство  $V^*$ , состоящее из линейных функций  $V \rightarrow \mathbb{F}$  и составим код

$$\mathcal{C} = S_P(k) = \{(f(v_1), \dots, f(v_n)) : f \in V^*\}.$$

Ясно, что  $|\mathcal{C}| = |V^*| = |V| = q^k$ , а  $d(\mathcal{C}) = n - (q^{k-1} - 1) = q^k - q^{k-1}$ , так как ядро любой ненулевой линейной функции — подпространство размерности  $k-1$  пространства  $V$ . Таким образом, вычисляя правую часть (1.3), имеем

$$\frac{nq^{k-1}(q-1)}{q^k-1} = q^{k-1}(q-1) = d(\mathcal{C}).$$

## Задачи к лекции 1.

**Задача 1.** Пусть  $\mathcal{C}$  есть  $[n, k, d]$ -код над алфавитом  $\Omega$  и  $d > 2r$ , причём  $q^k = \frac{q^n}{s_q(n, r)}$  (см. (1.2)). Покажите, что  $d = 2r + 1$ .

**Задача 2.** Опишите совершенные МДР-коды.

**Задача 3.** Опишите эквидистантные МДР-коды.

**Задача 4.** Приведите пример эквидистантного кода, для которого неравенство (1.3) является строгим.

**Задача 5.** Для кода  $\mathcal{C} = \{(a, b, a+b) \mid a, b \in \mathbb{Z}_m\}$  найдите размерность  $k$  и минимальное расстояние  $d$  для общего  $m$ . При каких  $m$  код  $\mathcal{C}$  является МДР-кодом?

**Задача 6.** Исследуйте существование линейных МДР-кодов длины  $n = 4$ , размерности  $k = 2$  над кольцом  $\mathbb{Z}_4$ .

## Лекция 2. Изометрические преобразования пространства Хэмминга. Теорема А.А. Маркова.

### 1°. Общий случай.

**Определение 2.1.** Пусть  $\Omega$  — алфавит,  $n \in \mathbb{N}$ . Биективное отображение  $\varphi : \Omega^n \rightarrow \Omega^n$  называется *изометрией*, если

$$d(\varphi(\mathbf{a}), \varphi(\mathbf{b})) = d(\mathbf{a}, \mathbf{b})$$

для любых слов  $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \Omega^n$  (иначе говоря, если  $\varphi$  сохраняет расстояние Хэмминга).

**Определение 2.2.** Если  $\Omega = M$  — модуль над кольцом  $\mathcal{R}$ , то изометрия  $\varphi : \Omega^n \rightarrow \Omega^n$  называется *линейной изометрией*, если  $\varphi : \Omega^n \rightarrow \Omega^n$  — гомоморфизм  $\mathcal{R}$ -модулей.

Заметим, что изометрии  $\mathfrak{S}(\Omega^n)$  составляют подгруппу группы  $S_{\Omega^n}$  всех биективных преобразований множества  $\Omega^n$  в себя.

Изометрии пространства Хэмминга устроены очень просто, как показывает следующая

**Теорема 2.3** (А.А. Марков, 1956 г.). Биекция  $\varphi : \Omega^n \rightarrow \Omega^n$  является изометрией тогда и только тогда, когда  $\varphi$  задаётся следующим правилом:

$$\forall \mathbf{a} = (a_1, \dots, a_n) \in \Omega^n, \quad \varphi(\mathbf{a}) = (\pi_1(a_{\sigma(1)}), \dots, \pi_n(a_{\sigma(n)})), \quad (2.1)$$

где  $\sigma \in S_n$ ,  $\pi_i \in S_{\Omega}$ ,  $i = 1, \dots, n$ , а  $S_{\Omega}$  обозначает группу всех биективных отображений множества  $\Omega$  в себя.

◀ Преобразования, заданные правилом (2.1), называются *мономиальными*. Очевидно, что мономиальное преобразование является изометрией.

1. Отметим, что мономиальные преобразования  $\mathcal{M}(\Omega^n)$  образуют подгруппу группы  $\mathfrak{S}(\Omega^n)$ . Действительно, очевидно, что тождественное отображение мономиально. Если  $\phi, \psi \in \mathcal{M}(\Omega^n)$  и  $\phi(\mathbf{a}) = (\pi_1(a_{\sigma(1)}), \dots, \pi_n(a_{\sigma(n)}))$ ,  $\psi(\mathbf{a}) = (\rho_1(a_{\tau(1)}), \dots, \rho_n(a_{\tau(n)}))$ , то

$$\begin{aligned} \psi\phi(\mathbf{a}) &= \psi(\pi_1(a_{\sigma(1)}), \dots, \pi_n(a_{\sigma(n)})) = \\ &= (\rho_1(\pi_{\tau(1)}(a_{\sigma\tau(1)}), \dots, \rho_n(\pi_{\tau(n)}(a_{\sigma\tau(n)}))), \end{aligned}$$

также является мономиальным преобразованием. Отсюда также следует мономиальность обратного к мономиальному отображению:  $\phi^{-1}(\mathbf{a}) = (\pi_{\sigma^{-1}(1)}^{-1}(a_{\sigma^{-1}(1)}), \dots, \pi_{\sigma^{-1}(n)}^{-1}(a_{\sigma^{-1}(n)}))$ .

2. Пусть  $\varphi \in \mathfrak{S}(\Omega^n)$  — произвольная изометрия. В силу сказанного выше для того, чтобы доказать мономиальность  $\varphi$ , достаточно доказать мономиальность преобразования вида  $\eta_1 \varphi \eta_2$ , где  $\eta_1, \eta_2 \in \mathcal{M}(\Omega^n)$ . Это позволит нам далее, не ограничивая общности считать, что  $\varphi$  обладает каким-то требуемым свойством, добившись того, чтобы  $\eta_1 \varphi \eta_2$  им обладало.

3. Переобозначив буквы алфавита, будем считать, что  $\Omega = \mathbb{Z}_q = \{0, 1, \dots, q-1\}$ . Положим  $\mathbf{0} = (0, \dots, 0)$ .

Можно считать, что  $\varphi(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$ . Действительно, если  $\varphi(\mathbf{0}) = (c_1, \dots, c_n)$  для тех  $i = 1, \dots, n$ , что  $c_i \neq 0$  возьмём в качестве  $\nu_i \in S_\Omega$  транспозицию  $(0, c_i)$ , для оставшихся  $i$  положим  $\nu_i = id$ . Взяв мономиальное преобразование  $\eta_1$ , соответствующие подстановкам  $\nu_i \in S_\Omega$  и тождественной  $\sigma \in S_n$ , получаем, что  $\eta_1 \varphi(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$ .

4. Как и в линейном случае, обозначим за  $\|\mathbf{a}\|$  число ненулевых координат слова  $\mathbf{a} \in \Omega^n$ . Имеем

$$\|\varphi(\mathbf{a})\| = d(\varphi(\mathbf{a}), \mathbf{0}) = d(\varphi(\mathbf{a}), \varphi(\mathbf{0})) = d(\mathbf{a}, \mathbf{0}) = \|\mathbf{a}\|.$$

5. В частности, для  $\mathbf{e}_s = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$  с единицей на  $s$ -ом месте,  $s = 1, \dots, n$ , из  $\|\mathbf{e}_s\| = 1$  получаем, что  $\|\varphi(\mathbf{e}_s)\| = 1$ , откуда

$$\varphi(\mathbf{e}_s) = u_s \mathbf{e}_{\omega(s)},$$

где  $u \mathbf{e}_i$  обозначает слово с  $u$  на  $i$ -ом месте и нулями на остальных,  $u_s \in \Omega \setminus \{0\}$ ,  $\omega : \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\}$ . Покажем, что  $\omega \in S_n$ . Пусть  $p, q \in \{1, \dots, n\}$ ,  $p \neq q$ . Тогда  $d(\mathbf{e}_p, \mathbf{e}_q) = 2$ , откуда  $d(u_p \mathbf{e}_{\omega(p)}, u_q \mathbf{e}_{\omega(q)}) = 2$ . Следовательно,  $\omega(p) \neq \omega(q)$ , т.е.  $\omega$  — инъективное отображение, поэтому  $\omega \in S_n$ . Для  $u_s \neq 1$  взяв транспозиции  $\tau_s = (1, u_s) \in S_\Omega$ , для оставшихся  $s$  положив  $\tau_s = id$  и определяя мономиальное преобразование  $\eta_2$ , соответствующее подстановкам  $\tau_s \in S_\Omega$  и тождественной  $\sigma \in S_n$ , и домножив  $\varphi$  на  $\eta_2$ , получаем, что

$$\varphi(\mathbf{e}_s) = \mathbf{e}_{\omega(s)}, \quad \omega \in S_n.$$

6. Для любого  $s \in \{1, \dots, n\}$  и любого  $u \in \Omega \setminus \{0\}$  имеем

$$\|\varphi(u \mathbf{e}_s)\| = \|u \mathbf{e}_s\| = 1,$$

$$d(\varphi(u \mathbf{e}_s), \mathbf{e}_{\omega(s)}) = d(u \mathbf{e}_s, \mathbf{e}_s) = 1.$$

Отсюда получаем, что

$$\varphi(u\mathbf{e}_s) = \pi_s(u)\mathbf{e}_{\omega(s)}, \quad \pi_s : \Omega \rightarrow \Omega, \pi_s(0) = 0, \pi_s(1) = 1.$$

При этом  $\pi_s \in S_\Omega$  для каждого  $s \in \{1, \dots, n\}$ . Действительно, если  $u, v \in \Omega, u \neq v$ , то

$$d(u\mathbf{e}_s, v\mathbf{e}_s) = 1 = d(\varphi(u\mathbf{e}_s), \varphi(v\mathbf{e}_s)) = d(\pi_s(u)\mathbf{e}_{\omega(s)}, \pi_s(v)\mathbf{e}_{\omega(s)}),$$

значит,  $\pi_s(u) \neq \pi_s(v)$ , т.е.  $\pi_s$  — инъективное отображение, поэтому  $\pi_s \in S_\Omega$ .

Взяв мономиальное отображение  $\eta_3$ , с подстановками, обратными к  $\pi_{\omega^{-1}(1)}, \dots, \pi_{\omega^{-1}(n)}$  и  $\omega$ , и умножив его на  $\varphi$ , будем считать, что

$$\varphi(u\mathbf{e}_s) = u\mathbf{e}_s, \quad \forall u \in \Omega, s \in \{1, \dots, n\}.$$

7. Докажем, что  $\varphi = id$  — тождественное преобразование на  $\Omega^n$ . Предположим противное: пусть  $\varphi(\mathbf{a}) = \mathbf{b}$ ,  $\mathbf{b} \neq \mathbf{a}$  для некоторых  $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \Omega^n$ . При этом по доказанному в пункте 4,  $\|\mathbf{b}\| = \|\mathbf{a}\|$ . По построению  $a_i \neq b_i$  для некоторого  $i \in \{1, \dots, n\}$ . Имеем две возможности.

*Случай*  $a_i = 0$ . Тогда  $b_i \neq 0$ , откуда

$$d(\mathbf{a}, b_i\mathbf{e}_i) = \|a\| + 1 = \|b\| + 1,$$

с другой стороны,

$$d(\varphi(\mathbf{a}), \varphi(b_i\mathbf{e}_i)) = d(\mathbf{b}, b_i\mathbf{e}_i) = \|b\| - 1.$$

Противоречие с тем, что  $\varphi$  — изометрия.

*Случай*  $a_i \neq 0$ . Тогда

$$d(\mathbf{a}, a_i\mathbf{e}_i) = \|a\| - 1 = \|b\| - 1,$$

с другой стороны,

$$d(\varphi(\mathbf{a}), \varphi(a_i\mathbf{e}_i)) = d(\mathbf{b}, a_i\mathbf{e}_i) \geq \|b\|.$$

Противоречие с тем, что  $\varphi$  — изометрия.

Полученные противоречия доказывают, что  $\varphi = id$ , поэтому мономиально. ►

**2°. Линейный случай.** Пусть  $\Omega = M$  — модуль над кольцом  $\mathcal{R}$ . Линейное мономиальное преобразование — преобразование вида (2.1), для которого  $\pi_s \in \text{Aut}(M)$ ,  $s \in \{1, \dots, n\}$ .

Докажем линейную версию теоремы А.А.Маркова.

**Теорема 2.4** (А.А.Марков). Биекция  $\varphi : M^n \rightarrow M^n$ , где  $M$  — модуль над кольцом  $\mathcal{R}$ , является линейной изометрией тогда и только тогда, когда она является линейным мономиальным преобразованием.

◀ Пусть  $\varphi$  — линейное мономиальное преобразование вида (2.1). Тогда

$$\begin{aligned}\varphi(\mathbf{a} + \mathbf{b}) &= (\pi_1(a_{\sigma(1)} + b_{\sigma(1)}), \dots, \pi_n(a_{\sigma(n)} + b_{\sigma(n)})) = \\ &= (\pi_1(a_{\sigma(1)}) + \pi_1(b_{\sigma(1)}), \dots, \pi_n(a_{\sigma(n)}) + \pi_n(b_{\sigma(n)})) = \varphi(\mathbf{a}) + \varphi(\mathbf{b})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\varphi(\mathbf{a}r) &= (\pi_1(a_{\sigma(1)}r), \dots, \pi_n(a_{\sigma(n)}r)) = \\ &= (\pi_1(a_{\sigma(1)})r, \dots, \pi_n(a_{\sigma(n)})r) = \varphi(\mathbf{a})r\end{aligned}$$

для любых  $r \in \mathcal{R}$ ,  $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in M^n$ . Следовательно,  $\varphi$  является линейной изометрией.

Обратно, пусть  $\varphi$  — линейная изометрия. По теореме 2.3  $\varphi$  является мономиальным преобразованием.

По линейности  $\varphi$  для любых  $r \in \mathcal{R}$ ,  $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in M^n$  имеем

$$\begin{aligned}(\pi_1(a_{\sigma(1)} + b_{\sigma(1)}), \dots, \pi_n(a_{\sigma(n)} + b_{\sigma(n)})) &= \varphi(\mathbf{a} + \mathbf{b}) = \\ &= \varphi(\mathbf{a}) + \varphi(\mathbf{b}) = (\pi_1(a_{\sigma(1)}) + \pi_1(b_{\sigma(1)}), \dots, \pi_n(a_{\sigma(n)}) + \pi_n(b_{\sigma(n)}))\end{aligned}$$

откуда получаем, что  $\pi_i(a + b) = \pi_i(a) + \pi_i(b)$  для любых  $a, b \in M$  и  $i \in \{1, \dots, n\}$ .

Аналогично,

$$\begin{aligned}(\pi_1(a_{\sigma(1)}r), \dots, \pi_n(a_{\sigma(n)}r)) &= \varphi(\mathbf{a}r) = \\ &= \varphi(\mathbf{a})r = (\pi_1(a_{\sigma(1)})r, \dots, \pi_n(a_{\sigma(n)})r),\end{aligned}$$

откуда получаем, что  $\pi_i(ar) = \pi_i(a)r$  для любых  $a \in M$ ,  $r \in \mathcal{R}$  и  $i \in \{1, \dots, n\}$ .

Следовательно,  $\pi_i \in \text{Aut}(M)$  для всех  $i \in \{1, \dots, n\}$ , поэтому  $\varphi$  является линейным мономиальным преобразованием. ▶

Рассмотрим важный частный случай, когда  $M = \mathcal{R}$ , т.е. линейные коды над кольцом  $\mathcal{R}$ . Любой эндоморфизм  $\pi$  (гомоморфизм в себя) кольца  $\mathcal{R}$  определяется элементом  $\pi(1)$ , поскольку  $\pi(r) = \pi(1)r$ . При этом  $\pi \in \text{Aut}(\mathcal{R}_{\mathcal{R}})$  тогда и только тогда, когда  $\pi(1) \in \mathcal{R}^*$  — обратимый элемент кольца  $\mathcal{R}$ .

Следовательно, для любой линейной изометрии  $\varphi$  модуля  $\mathcal{R}^n$  существуют элементы  $u_1, \dots, u_n \in \mathcal{R}^*$  и  $\sigma \in S_n$  такие, что  $\varphi$  задается правилом

$$\forall \mathbf{a} \in \mathcal{R}^n : \varphi(\mathbf{a}) = (u_1 a_{\sigma(1)}, \dots, u_n a_{\sigma(n)}).$$

**Определение 2.5.** Два (линейных) кода  $\mathcal{C}_1$  и  $\mathcal{C}_2$  длины  $n$  над алфавитом  $\Omega$  называются (*линейно*) *эквивалентными*, если существует (линейная) изометрия  $\varphi : \Omega^n \rightarrow \Omega^n$ , такая, что  $\varphi(\mathcal{C}_1) = \mathcal{C}_2$ .

Сразу заметим, что все параметры эквивалентных кодов одинаковы.

**Определение 2.6.** Подгруппа  $\text{Aut}(\mathcal{C}) = \{\sigma \in \mathfrak{S}(\Omega^n) : \sigma(\mathcal{C}) = \mathcal{C}\}$  называется *группой автоморфизмов* кода  $\mathcal{C}$ .

**Определение 2.7.** Подгруппа  $\mathcal{L}\text{Aut}(\mathcal{C}) = \text{Aut}(\mathcal{C}) \cap \text{Aut}(M^n)$  называется *группой линейных автоморфизмов* линейного кода  $\mathcal{C}$ .

Используя теорему Лагранжа и связь орбит и стабилизаторов действия, можно получить

**Теорема 2.8.** Число кодов  $\mathcal{C}' \in \Omega^n$ , эквивалентных коду  $\mathcal{C} \in \Omega^n$  равно индексу  $[\mathfrak{S}(\Omega^n) : \text{Aut}(\mathcal{C})]$  подгруппы  $\text{Aut}(\mathcal{C})$  в группе  $\mathfrak{S}(\Omega^n)$ . Если  $\mathcal{C}' = \sigma(\mathcal{C})$ ,  $\sigma \in \mathfrak{S}(\Omega^n)$ , то  $\text{Aut}(\mathcal{C}') = \sigma^{-1} \text{Aut}(\mathcal{C}) \sigma$ .

## Задачи к лекции 2.

**Задача 1.** Покажите, что группа  $\mathfrak{S}(\Omega^n)$  всех изометрий пространства  $\Omega^n$  — это полупрямое произведение  $(S_\Omega)^n \rtimes S_n$ .

**Задача 2.** Покажите, что для двоичного алфавита ( $\Omega = \mathbb{Z}_2$ ) группа линейных изометрий совпадает с группой всех преобразований вида  $\mathbf{x}^T \rightarrow P\mathbf{x}^T + \mathbf{v}^T$ , где  $P$  — матрица перестановки координат и  $\mathbf{v}^T$  — фиксированный вектор-столбец.

**Задача 3.** Заметим, что линейная изометрия  $\sigma$  над конечным полем  $\mathbb{F}$  — это линейный оператор на пространстве  $\mathbb{F}^n$ . Укажите вид матрицы этого оператора в стандартном базисе.

**Задача 4.** Докажите, что группа линейных изометрий действует транзитивно на множестве слов фиксированного веса  $m$  (для любого  $0 \leq m \leq n$ ), т.е. для любых слов  $\mathbf{a}, \mathbf{b}$  одинакового веса  $m$  существует изометрия  $\sigma$  такая, что  $\sigma(\mathbf{a}) = \mathbf{b}$ .

**Задача 5.** Найдите группу автоморфизмов простого двоичного кода  $\mathcal{C} = \{(0, 0, 0), (1, 1, 1)\}$  длины 3.

**Задача 6.** Найдите группу автоморфизмов кода констант  $\mathcal{C} = \{(a, \dots, a) \in \Omega^n\}$  для произвольных  $\Omega$  и  $n$ .

**Задача 7.** Найдите группу автоморфизмов двоичного кода Хэмминга  $\mathcal{H}_2(l)$ .

### Лекция 3. Реальная длина кода. Теорема Мак-Вильямс о продолжении изометрий линейных кодов.

**Определение 3.1.** Пусть  $\mathbb{F}$  — произвольное конечное поле. Линейные коды  $\mathcal{C}, \mathcal{L} \leq \mathbb{F}\mathbb{F}^n$  линейно изометричны, если существует изоморфизм линейных пространств

$$\tau : \mathbb{F}\mathcal{C} \rightarrow \mathbb{F}\mathcal{L} \quad (3.1)$$

такой, что

$$d(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = d(\tau(\mathbf{a}), \tau(\mathbf{b})) \quad \forall \mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathcal{C}. \quad (3.2)$$

**Определение 3.2.** Реальной длиной кода  $\mathcal{C}$  называется число

$$l(\mathcal{C}) = |\{i \in \{1, \dots, n\} : \exists \mathbf{a} = (a_1, \dots, a_n) \in \mathcal{C} \ a_i \neq 0\}|.$$

Сначала докажем вспомогательную лемму.

Код  $\mathcal{C}$  в этом случае можно рассматривать как код длины  $l(\mathcal{C})$ , при этом  $l(\mathcal{C})$  минимальное такое число.

Реальная длина кода также связана и с другими кодовыми параметрами. Докажем два утверждения о её связи с весами кодовых слов в линейном случае.

Пусть  $\mathcal{C} \leq \mathbb{F}^n$  — линейный код над полем  $\mathbb{F}$ .

Очевидно, что  $d(\mathcal{C}) \leq \|\mathbf{a}\| \leq l(\mathcal{C})$  для любого слова  $\mathbf{a} \in \mathcal{C} \setminus \{0\}$ , т.е. минимальное кодовое расстояние и реальная длина кода служат границами весов кодовых слов. По определению минимального расстояния слово веса  $d(\mathcal{C})$  в коде  $\mathcal{C}$  всегда содержится. Следующее предложение показывает, когда в коде  $\mathcal{C}$  есть слово веса  $l(\mathcal{C})$ .

**Предложение 3.3.** Пусть  $\mathbb{F}$  — конечное поле мощности  $q$ . Тогда

1. любой линейный код  $\mathcal{C} \leq \mathbb{F}^n$ , имеющий реальную длину  $l(\mathcal{C}) \leq q$ , содержит слово веса  $l(\mathcal{C})$ ;
2. для любого такого  $l$ , что  $n \geq l > q$ , среди кодов длины  $n$  и реальной длины  $l$  существуют коды, не содержащие слов веса  $l$ .

◀ Положим  $l = l(\mathcal{C})$ . Для простоты обозначений пусть ненулевые координаты слов из  $\mathcal{C}$  расположены в позициях  $1, \dots, l$ .

1. Пусть  $l \leq q$ . Обозначим  $\mathbf{a}(i) = (a(i)_1, \dots, a(i)_n) \in \mathcal{C}$ , так что  $a(i)_i \neq 0, i = 1, \dots, l$ .

Доказательство проведем индукцией по  $l$ .

*База индукции.* При  $l \leq 1$  утверждение верно.

*Шаг индукции.* Допустим, что  $l > 1$  и для  $l - 1$  утверждение доказано.

Это означает, что существует слово  $\mathbf{a} \in \langle \mathbf{a}(i) \mid i = 1, \dots, l - 1 \rangle$  такое, что  $a_k \neq 0$ ,  $k = 1, \dots, l - 1$ . Действительно, предположение индукции применимо к коду  $\mathcal{C}' = \langle \tilde{\mathbf{a}}(i) \mid i = 1, \dots, l - 1 \rangle$ , где  $\tilde{\mathbf{a}}(i)_m = a(i)_m$ , при  $m \neq l$ , и  $\tilde{\mathbf{a}}(i)_l = 0$ . При этом в  $\mathcal{C}'$  слово  $\tilde{\mathbf{a}}$  веса  $l - 1$  выражается как линейная комбинация  $\tilde{\mathbf{a}} = \sum_{j=1}^{l-1} \alpha_j \tilde{\mathbf{a}}(j)$ . Тогда можно

взять  $\mathbf{a} = \sum_{j=1}^{l-1} \alpha_j \mathbf{a}(j)$  и  $a_k = \tilde{a}_k \neq 0$  при  $k = 1, \dots, l - 1$ .

Добавляем к рассмотрению слово  $\mathbf{b} = \mathbf{a}(l)$ .

Если  $a_l \neq 0$ , то  $\|\mathbf{a}\| = l$  и это требуемое слово; если  $b_i \neq 0$  для всех  $i = 1, \dots, l$ , то  $\|\mathbf{b}\| = l$  и это требуемое слово. В противном случае рассмотрим слова  $\mathbf{a} + \alpha \mathbf{b}$ ,  $\alpha \in \mathbb{F}$ ,  $\alpha \neq 0$ . Пусть  $y_i(x) = b_i x + a_i$ ,  $i = 1, \dots, l - 1$ . При каждом  $i$  по построению  $a_i \neq 0$ , значит уравнение  $y_i(x) = 0$  имеет в  $\mathbb{F}$  не более одного решения. При этом слово  $\mathbf{b}$  имеет нулевую координату в позициях  $[1, l]$ , значит по крайней мере одно из уравнений  $y_i(x) = 0$  несовместно. Следовательно, если  $X = \{x \in \mathbb{F} \mid \exists i \in \{1, \dots, l - 1\} y_i(x) = 0\}$ , то  $|X| \leq l - 2$ . Из условия на число элементов поля следует, что найдётся  $\alpha \in \mathbb{F}$ ,  $\alpha \neq 0$ , что  $\alpha \notin X$ , т.е.  $a_i + \alpha b_i \neq 0$ ,  $i = 1, \dots, l$ . Слово  $\mathbf{a} + \alpha \mathbf{b} \in \langle \mathbf{a}(i) \mid i = 1, \dots, l \rangle$  и есть искомое.

2. Пусть  $n \geq l > q$ . Рассмотрим  $\mathcal{C} = \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle \leq \mathbb{F}^n$ , где  $a_2 = \dots = a_l = 1$ ,  $a_1 = a_{l+1} = \dots = a_n = 0$ ,  $b_1 = 1$ ,  $b_2 = b_{q+2} = \dots = b_n = 0$ ,  $b_3, \dots, b_{q+1}$  — все различные ненулевые элементы поля  $\mathbb{F}$ . Тогда для любого  $\alpha \in \mathbb{F}^*$  имеем номер  $t = 3, \dots, q + 1$ , что  $\alpha = -b_t$ . Поэтому в слове  $\mathbf{b} + \alpha \mathbf{a}$  на месте  $t$  стоит 0 и значит, его вес меньше  $l$ . Все слова в коде  $\mathcal{C}$  кратны  $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ , либо  $\mathbf{b} + \alpha \mathbf{a}$ , поэтому содержат 0 на позициях  $[1, l]$ . Таким образом, в коде  $\mathcal{C}$  реальной длины  $l$  нет слов веса  $l$ . ►

Для доказательства теоремы Мак-Вильямс сначала докажем вспомогательную лемму.

**Лемма 3.4.** Пусть  $\mathbb{F}$  — конечное поле мощности  $q$ . Тогда для любого линейного кода  $\mathcal{C} \leq \mathbb{F}^n$  справедливо равенство

$$\sum_{\mathbf{a} \in \mathcal{C}} \|\mathbf{a}\| = \frac{q-1}{q} |\mathcal{C}| l(\mathcal{C}).$$

◀ Для каждого  $i \in \{1, \dots, n\}$  рассмотрим проекцию

$$\pi_i : \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}, \pi_i(\mathbf{a}) = a_i.$$

Поскольку  $\pi_i$  — гомоморфизм пространств, то  $\pi_i(\mathcal{C})$  является подпространством  $\mathbb{F}$ , соответственно,  $\pi_i(\mathcal{C}) \in \{0, \mathbb{F}\}$  и

$$l(\mathcal{C}) = |\{i \in \{1, \dots, n\} : \pi_i(\mathcal{C}) = \mathbb{F}\}|.$$

Кроме того, если рассмотреть ядро ограничения гомоморфизма  $\pi_i$  на пространство  $\mathcal{C}$ :  $\mathcal{K}_i = \text{Ker}(\pi_i|_{\mathcal{C}})$ , то по теореме о гомоморфизме

$$|\mathcal{K}_i| = \frac{|\mathcal{C}|}{|\pi_i(\mathcal{C})|} = \begin{cases} \frac{|\mathcal{C}|}{q}, & \text{если } \pi_i(\mathcal{C}) = \mathbb{F}, \\ |\mathcal{C}| & \text{если } \pi_i(\mathcal{C}) = 0. \end{cases}$$

Справедливы равенства

$$\sum_{\mathbf{a} \in \mathcal{C}} \|\mathbf{a}\| = \sum_{\mathbf{a} \in \mathcal{C}} \sum_{i=1}^n \|a_i\| = \sum_{i=1}^n \sum_{\mathbf{a} \in \mathcal{C}} \|a_i\|.$$

При условии  $\pi_i(\mathcal{C}) = \mathbb{F}$  прообраз в  $\mathcal{C}$  каждого элемента  $a \in \mathbb{F}$  при гомоморфизме  $\pi_i|_{\mathcal{C}}$  имеет мощность  $|\mathcal{K}_i|$ , поэтому

$$\sum_{\mathbf{a} \in \mathcal{C}} \|a_i\| = \sum_{\mathbf{a} \in \mathcal{C}} \|\pi_i(\mathbf{a})\| = |\mathcal{K}_i| \sum_{a \in \mathbb{F}} \|a\| = |\mathcal{K}_i|(q-1) = \frac{q-1}{q} |\mathcal{C}|.$$

При условии  $\pi_i(\mathcal{C}) = 0$  имеем  $\sum_{\mathbf{a} \in \mathcal{C}} \|a_i\| = 0$ .

В итоге,

$$\sum_{i=1}^n \sum_{\mathbf{a} \in \mathcal{C}} \|a_i\| = \frac{q-1}{q} |\mathcal{C}| l(\mathcal{C}).$$

►

**Следствие 3.5.** Пусть  $\mathbb{F}$  — конечное поле. Если эквидистантный линейный код  $\mathcal{C} \leq \mathbb{F}^n$  лежит на границе Плоткина, то  $l(\mathcal{C}) = n$ .

◀ Вспомним, что код лежит на границе Плоткина, если  $d = \frac{q-1}{q} \frac{|\mathcal{C}|}{|\mathcal{C}|-1} n$ .

Для эквидистантного линейного кода имеем  $\|\mathbf{a}\| = d$  для любого  $\mathbf{a} \in \mathcal{C} \setminus \{0\}$ , откуда по лемме о сумме весов получаем  $\sum_{\mathbf{a} \in \mathcal{C}} \|\mathbf{a}\| =$

$$(|\mathcal{C}| - 1)d = \frac{q-1}{q} |\mathcal{C}| l(\mathcal{C}) \text{ и } d = \frac{q-1}{q} \frac{|\mathcal{C}|}{|\mathcal{C}|-1} l(\mathcal{C}).$$

Приравнивая эти два выражения для  $d$  получаем требуемое равенство  $l(\mathcal{C}) = n$ . ►

Перейдём к основной теореме данной лекции.

**Теорема 3.6** (Теорема Ф. Мак-Вильямс, 1962). Пусть  $\mathbb{F}$  — произвольное конечное поле. Тогда любая линейная изометрия (3.1) линейных кодов над  $\mathbb{F}$  продолжается до линейного над  $\mathbb{F}$  мономиального преобразования (2.1).

◀ Как было показано в теореме 2.3, мономиальные преобразования  $\mathcal{M}(\mathbb{F}^n)$  образуют группу. Поэтому для доказательства существования продолжения  $\tau$ , достаточно доказать результат для произведения  $\tau$  и некоторых мономиальных преобразований.

Проведём доказательство индукцией по  $l(\mathcal{C}) \geq 0$ .

*База индукции.* Если  $l(\mathcal{C}) = 0$ , то  $\mathcal{C} = 0$ . В этом случае утверждение очевидно: в качестве продолжения  $\tau$  можно взять произвольное мономиальное преобразование из  $\mathcal{M}(\mathbb{F}^n)$ .

*Шаг индукции.* Пусть теорема верна для всех кодов  $\mathcal{C}, \mathcal{L} \leq \mathbb{F}^n$  произвольной длины  $n \in \mathbb{N}$  таких, что  $0 \leq l(\mathcal{C}) < l$  для некоторого  $l \in \mathbb{N}$ . Докажем её для  $l(\mathcal{C}) = l$ . Ввиду линейности отображения  $\tau$  на пространстве  $\mathcal{C}$  условие (3.2) эквивалентно

$$\|\tau(\mathbf{a})\| = \|\mathbf{a}\| \quad \forall \mathbf{a} \in \mathcal{C}.$$

По лемме 3.4 отсюда следует, что  $l(\mathcal{L}) = l(\mathcal{C})$ .

Поскольку  $l(\mathcal{C}) = l > 0$ , то  $\pi_i(\mathcal{C}) = \mathbb{F}$  для некоторого  $i \in \{1, \dots, n\}$ . Умножив при необходимости  $\tau$  справа на мономиальное преобразование, меняющее местами  $i$ -ую и первую координаты, без ограничения общности можем считать, что  $i = 1$ . Тогда код  $\mathcal{C}$  содержит слово  $\mathbf{a}_1 = (1, *, \dots, *)$ . Вспомним, что для  $\mathcal{K}_1 = \text{Ker}(\pi_1|_{\mathcal{C}})$  справедливо  $\dim \mathcal{K}_1 = \dim \mathcal{C} - 1$ ,  $|\mathcal{K}_1| = \frac{|\mathcal{C}|}{q}$ ,  $q = |\mathbb{F}|$ . Более того,

$$\mathcal{C} = \mathbb{F}\mathbf{a}_1 \oplus \mathcal{K}_1,$$

т.к.  $\mathbf{a}_1 \notin \mathcal{K}_1$  по построению. Поскольку по определению первые координаты всех слов в  $\mathcal{K}_1$  равны нулю и  $\mathcal{K}_1 \subset \mathcal{C}$ , то

$$l(\mathcal{K}_1) \leq l - 1 < l.$$

Рассмотрим линейный код  $\tau(\mathcal{K}_1) \subset \tau(\mathcal{C}) = \mathcal{L}$ . По лемме 3.4 отсюда следует, что  $l(\tau(\mathcal{K}_1)) = l(\mathcal{K}_1) < l$ . Следовательно, существует индекс  $j \in \{1, \dots, n\}$  такой, что  $\pi_j(\mathcal{L}) = \mathbb{F}$ , но  $\pi_j(\tau(\mathcal{K}_1)) = 0$ . Умножив при необходимости  $\tau$  слева на мономиальное преобразование, меняющее местами  $j$ -ую и первую координаты, без ограничения общности можем считать, что  $j = 1$ . Рассмотрим подпространство  $\mathcal{L}_1 = \text{Ker}(\pi_1) \cap \mathcal{L}$ . Имеем  $\tau(\mathcal{K}_1) \subseteq \mathcal{L}_1$ . Поскольку  $\pi_1(\mathcal{L}) = \mathbb{F}$ , то  $|\mathcal{L}_1| = \frac{|\mathcal{L}|}{q} = \frac{|\mathcal{C}|}{q} = |\mathcal{K}_1|$ . Следовательно,  $\tau(\mathcal{K}_1) = \mathcal{L}_1$ .

Поскольку  $\tau$  — биекция из  $\mathcal{C}$  в  $\mathcal{L}$ ,  $\tau(\mathcal{K}_1) = \mathcal{L}_1$  и  $\mathbf{a}_1 \notin \mathcal{K}_1$ , то  $\tau(\mathbf{a}_1) \notin \mathcal{L}_1$ . Значит,  $\tau(\mathbf{a}_1) = \mathbf{b}_1 = (\beta, *, \dots, *)$ ,  $\beta \in \mathbb{F}^*$ . Откуда имеем разложение

$$\mathcal{L} = \mathbb{F}\mathbf{b}_1 \oplus \mathcal{L}_1.$$

Для произвольного числа  $c \in \mathbb{F}$  из линейности  $\tau$  следует, что

$$\tau(c\mathbf{a}_1) = c\tau(\mathbf{a}_1) = c\mathbf{b}_1 = (c\beta, *, \dots, *).$$

Тогда для произвольного слова  $\mathbf{a} \in \mathcal{C}$  получаем

$$\mathbf{a} = a_1\mathbf{a}_1 + (0, a'_2, \dots, a'_n), \quad \tau(\mathbf{a}) = a_1\tau(\mathbf{a}_1) + \tau((0, a'_2, \dots, a'_n)),$$

причём  $\tau((0, a'_2, \dots, a'_n)) \in \mathcal{L}_1$ , откуда

$$\tau(\mathbf{a}) = (a_1\beta, \tau_2(\mathbf{a}), \dots, \tau_n(\mathbf{a})),$$

где  $\tau_i : \mathcal{C} \rightarrow \mathbb{F}$ ,  $i \in \{2, \dots, n\}$  — линейные функции.

Покажем, что линейные функции  $\tau_2, \dots, \tau_n$  не зависят от первой координаты вектора  $\mathbf{a} \in \mathcal{C}$ , т.е. для любых  $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathcal{C}$ , если  $a_2 = b_2, \dots, a_n = b_n$ , то  $\tau_i(\mathbf{a}) = \tau_i(\mathbf{b})$ ,  $i \in \{2, \dots, n\}$ . Если  $a_1 \neq b_1$ , то  $\|\mathbf{a} - \mathbf{b}\| = 1$ . Поскольку  $\tau$  — линейная изометрия, то  $\|\tau(\mathbf{a}) - \tau(\mathbf{b})\| = 1$ . При этом  $(\tau(\mathbf{a}))_1 = a_1\beta \neq b_1\beta = (\tau(\mathbf{b}))_1$ , следовательно, все остальные координаты этих векторов обязательно равны.

Введём обозначения

$$\mathcal{C}' = \{(a_2, \dots, a_n) \in \mathbb{F}^{n-1} : \exists a_1 \in \mathbb{F}(a_1, a_2, \dots, a_n) \in \mathcal{C}\},$$

$$\mathcal{L}' = \{(b_2, \dots, b_n) \in \mathbb{F}^{n-1} : \exists b_1 \in \mathbb{F}(b_1, b_2, \dots, b_n) \in \mathcal{L}\},$$

и зададим отображение  $\tau' : \mathcal{C}' \rightarrow \mathbb{F}^{n-1}$  условием

$$\tau'((a_2, \dots, a_n)) = (\tau_2(\mathbf{a}), \dots, \tau_n(\mathbf{a})) \quad \forall (a_2, \dots, a_n),$$

где  $a_1 \in \mathbb{F}$  произвольная константа, для которой  $(a_1, a_2, \dots, a_n) \in \mathcal{C}$ . По доказанному выше отображение  $\tau'$  определено корректно (не зависит от выбора  $a_1$ ). Поскольку  $\tau : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{L}$  — биекция, то из равенства  $\tau(\mathbf{a}) = (a_1\beta, \tau_2(\mathbf{a}), \dots, \tau_n(\mathbf{a}))$  заключаем, что  $\tau'(\mathcal{C}') = \mathcal{L}'$ , т.е.  $\tau'$  — изоморфизм линейных пространств  $\mathcal{C}'$  и  $\mathcal{L}'$ . Поскольку

$$\forall \mathbf{a} \in \mathcal{C} : \|\tau(\mathbf{a})\| = \|\mathbf{a}\| = \|a_1\| + \|(a_2, \dots, a_n)\|$$

и

$$\|\tau(\mathbf{a})\| = \|a_1\beta\| + \|\tau'(a_2, \dots, a_n)\|,$$

то

$$\forall \mathbf{a}' \in \mathcal{C}' : \|\tau'(\mathbf{a}')\| = \|\mathbf{a}'\|.$$

Таким образом,  $\tau' : \mathcal{C}' \rightarrow \mathcal{L}'$  — линейная изометрия. Из определения пространства  $\mathcal{C}'$  также следует, что  $l(\mathcal{C}') = l - 1 < l$ . Соответственно, можно применить предположение индукции: линейная изометрия  $\tau'$  продолжается до линейного мономиального преобразования  $\sigma' : \mathbb{F}^{n-1} \rightarrow \mathbb{F}^{n-1}$ , с подстановкой  $\rho' \in S_{n-1}$  на множестве  $\{2, \dots, n\}$  и обратимыми константами  $u_2, \dots, u_n \in \mathbb{F}^*$ . Тогда продолжением  $\tau$  будет мономиальное преобразование  $\sigma : \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^n$ , с подстановкой  $\rho \in S_n$ ,  $\rho(1) = 1$ ,  $\rho(j) = \rho'(j)$ ,  $j \in \{2, \dots, n\}$ , и обратимыми константами  $\beta, u_2, \dots, u_n \in \mathbb{F}^*$ . ►

### Задачи к лекции 3.

**Задача 1.** Пусть  $\Omega = \mathbb{F}_2$ ,  $n = 4$ ,  $\mathcal{C} = \mathcal{L} \subset \mathbb{F}_2^4$  — код проверки на чётность и  $\tau : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{L}$  линейное отображение, определённое на базисе  $\tau((1, 1, 0, 0)) = (0, 0, 1, 1)$ ,  $\tau((1, 0, 1, 0)) = (1, 0, 1, 0)$ ,  $\tau((1, 0, 0, 1)) = (0, 1, 1, 0)$  и продолженное по линейности. а) Докажите, что  $\tau : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{L}$  — изометрия; б) постройте линейную изометрию  $\sigma \in \mathfrak{S}(\mathbb{F}_2^4)$ , продолжающую  $\tau$ ; в) установите, сколько всего линейных изометрий  $\mathfrak{S}(\mathbb{F}_2^4)$  являются продолжениями  $\tau$ ?

**Задача 2.** Приведите пример кодов и их изометрии, для которых не выполняется утверждение теоремы Мак-Вильямс о продолжении.

**Задача 3.** (О замене условия линейности на мощность). Пусть  $\Omega = \mathbb{F}_2$ ,  $n = 3$ . Найдите минимальное такое  $m \in \mathbb{N}$ , что любая изометрия  $\tau : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{L}$  произвольных кодов из  $\Omega^3$  мощности не менее  $m$  продолжается до мономиального преобразования на  $\Omega^3$ .

**Задача 4.** (О замене условия линейности на область определения). Пусть  $\Omega = \mathbb{F}_2$ ,  $n \in \mathbb{N}$ . Пусть  $\mathcal{C} = \{\mathbf{0}, \mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\} \subset \Omega^n$ ,  $\mathcal{L} \subset \Omega^n$ . Покажите, что любая изометрия  $\tau : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{L}$  продолжается до мономиального преобразования на  $\Omega^n$ .

**Лекция 4. Проверочная и порождающая матрицы, гарантируемый ранг и расстояние линейного кода над полем. Проверочная и порождающая матрицы в стандартной форме. Двойственный код, его проверочная и порождающая матрицы. Коды, двойственные к двоичному коду Хэмминга и к обобщённому коду Рида–Соломона.**

**1°. Проверочная и порождающая матрицы, гарантируемый ранг и расстояние линейного кода над полем. Проверочная и порождающая матрицы в стандартной форме.**

**Определение 4.1.** Пусть  $S$  — произвольное множество элементов правого модуля  $M$  над кольцом  $\mathcal{R}$ . Наименьший (по включению) подмодуль  $\langle S \rangle_{\mathcal{R}}$  модуля  $M$ , содержащий множество  $S$ , называется *подмодулем, порождённым множеством  $S$* .

Если  $N = \langle S \rangle_{\mathcal{R}}$ , говорят также, что  $S$  — *система образующих подмодуля  $N$* .

**Предложение 4.2.** Пусть  $S$  — произвольное множество элементов правого модуля  $M$  над кольцом  $\mathcal{R}$ . Тогда

$$\langle S \rangle_{\mathcal{R}} = \mathcal{S}\mathcal{R} = \{x_1r_1 + \dots + x_nr_n : x_i \in S, r_i \in \mathcal{R}, i = 1, \dots, n, n \geq 0\}.$$

**Определение 4.3.** Если слова  $g_i = (g_{i1}, \dots, g_{in})$ ,  $i = 1, \dots, m$  порождают код  $\mathcal{C}$  длины  $n$  над модулем  $M$ , то матрица

$$G = \begin{pmatrix} g_{11} & \dots & g_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ g_{m1} & \dots & g_{mn} \end{pmatrix}$$

называется *порождающей матрицей* кода  $\mathcal{C}$ .

**Определение 4.4.** Пусть  $M$  — левый  $\mathcal{R}$ -модуль и  $\mathcal{C}$  — код над  $M$  длины  $n$ . Матрица  $H = (h_{ij})$  размера  $r \times n$  над кольцом  $\mathcal{R}$  называется *проверочной матрицей* кода  $\mathcal{C}$  длины  $n$  над  $M$ , если

$$\mathcal{C} = \{\mathbf{a} \in M^n : H\mathbf{a}^T = 0\}. \quad (4.1)$$

Можно заметить, что для кодов над модулями и даже над кольцами проверочная матрица существует далеко не всегда. Однако, из курса линейной алгебры следует, что в случае линейных кодов над

полем  $\mathbb{F}$  ( $M = \mathcal{R} = \mathbb{F}$ ) любой код (т.е. подпространство в  $\mathbb{F}^n$ ) задаётся некоторой однородной системой линейных уравнений вида (4.1), которой заведомо удовлетворяют строки порождающей матрицы кода и не удовлетворяют никакие другие векторы. Поэтому получаем следующий критерий.

**Теорема 4.5.** Пусть  $G$  и  $H$  — матрицы над полем  $\mathbb{F}$  размеров  $r \times n$  и  $m \times n$ , соответственно. Тогда следующие условия эквивалентны:

1.  $G$  и  $H$  — порождающая и проверочная матрицы некоторого кода  $\mathcal{C}$  длины  $n$  над  $\mathbb{F}$ ;
2.  $HG^T = 0$  и  $\text{rk}(G) + \text{rk}(H) = n$ .

При этом размерность кода  $\mathcal{C}$  равна  $\text{rk}(G)$ .

Из (4.1) и теоремы 4.5 легко следует, что если умножить проверочную матрицу  $H$  (соответственно, порождающую матрицу  $G$ ) кода  $\mathcal{C}$  слева на обратимую матрицу  $A$ , (соответственно,  $B$ ) допустимых размеров, то определяемый каждой из них код не изменится (т.к.  $AH(BG)^T = AHG^TB = 0$ ). В частности, элементарные преобразования строк матриц  $H$  и  $G$ , т.е. прибавление к строке другой строки, умноженной на элемент поля, перестановка строк и умножение строки на ненулевой элемент поля, не меняют множества решений системы (4.1) (соответственно, линейной оболочки системы строк матрицы  $G$ ), поэтому можно считать, что каждая из них содержит набор столбцов единичной матрицы порядков  $n - \text{rk}(\mathcal{C})$  и  $\text{rk}(\mathcal{C})$ , соответственно, и число строк каждой из них равно её рангу.

*Пример.* Код проверки на чётность над полем задаётся матрицами

$$H = (1 \quad 1 \quad \dots \quad 1) \text{ и } G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 & -1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Перестановка столбцов порождающей матрицы линейного кода соответствует переходу к некоторому линейно эквивалентному коду. При этом проверочную матрицу нового кода можно получить той же перестановкой столбцов. Следовательно, любой линейный код над полем линейно эквивалентен коду с проверочной матрицей *стандартного вида*:  $H = (H' | -E)$ , где  $E$  — единичная матрица порядка  $n - k$ , а  $H'$  — некоторая матрица размера  $n - k \times k$ .

Смысл этой записи в том, что первые  $k$  символов любого кодового слова  $(a_1, \dots, a_n)$  являются определяющими, а остальные вычисляются как  $(a_{k+1}, \dots, a_n) = (a_1, \dots, a_k)(H')^T$ .

Если код  $\mathcal{C}$  имеет проверочную матрицу  $H$  в стандартной форме, то условиям  $HG^T = 0$ ,  $\text{rk}H + \text{rk}G = n$  удовлетворяет матрица  $G = (E|(H')^T)$  размера  $k \times n$ , где  $E$  — единичная матрица порядка  $k$ . Она называется порождающей матрицей *стандартного вида*. Соответственно, любой линейный код над полем линейно эквивалентен коду с порождающей матрицей стандартного вида.

**Определение 4.6.** *Гарантируемым рангом* прямоугольной матрицы  $A$  над полем  $\mathbb{F}$  называется число  $\varkappa(A)$ , равное максимальному числу  $s$  такому, что любые  $s$  столбцов матрицы линейно независимы (если  $A$  содержит нулевой столбец, считаем, что  $\varkappa(A) = 0$ ).

Очевидно, что  $\text{rk}(A) \geq \varkappa(A)$ .

**Предложение 4.7.** Если  $H$  — проверочная матрица ненулевого линейного кода  $\mathcal{C}$  над полем, то  $d(\mathcal{C}) = \varkappa(H) + 1$ . Код  $\mathcal{C}$  является МДР-кодом в точности тогда, когда  $\varkappa(H) = \text{rk}H$ .

◀ Наличие в коде  $\mathcal{C}$  слова веса  $d$  равносильно тому, что некоторые  $d$  столбцов матрицы  $H$  линейно зависимы, откуда  $d(\mathcal{C}) > \varkappa(H)$ . С другой стороны, по определению гарантируемого ранга, существует линейно зависимая система из  $\varkappa(H) + 1$  столбцов матрицы  $H$ , откуда  $d \leq \varkappa(H) + 1$ .

Действительно,  $d(\mathcal{C}) = \varkappa(H) + 1$  и  $n - k + 1 = \text{rk}H + 1$ . Поэтому  $d(\mathcal{C}) = n - k + 1$  в точности при совпадении  $\varkappa(H) = \text{rk}H$ . ▶

**Предложение 4.8.** Линейный код  $\mathcal{C}$  над полем с проверочной матрицей  $H = (H'| -E)$  стандартного вида является МДР-кодом тогда и только тогда, когда в матрице  $H'$  все квадратные подматрицы невырождены.

◀ Согласно предыдущему предложению,  $\mathcal{C}$  есть МДР-код тогда и только тогда, когда любая система из  $n - k$  столбцов матрицы  $H$  линейно независима. Пусть  $H'[i_1, \dots, i_s | j_1, \dots, j_s]$  подматрица размера  $s \times s$  матрицы  $H'$ , составленная из элементов, стоящих на пересечении строк с номерами  $i_1, \dots, i_s$  и столбцов с номерами  $j_1, \dots, j_s$ . Рассмотрим систему столбцов матрицы  $H$  с номерами  $j_1, \dots, j_s, k + i_{s+1}, \dots, k + i_{n-k}$ , где  $i_{s+1}, \dots, i_{n-k} \in \{1, \dots, n - k\} \setminus \{i_1, \dots, i_s\}$ . Т.е.

это столбцы с номерами  $j_1, \dots, j_s$  из матрицы  $H'$  и столбцы с номерами  $i_{s+1}, \dots, i_{n-k}$  из матрицы  $-E$ . По формуле разложения определителя по столбцу определитель матрицы  $(n-k) \times (n-k)$ , построенный на этих столбцах, равен  $\pm \det H'[i_1, \dots, i_s | j_1, \dots, j_s]$ . Следовательно, линейная независимость этих столбцов равносильна невырожденности подматрицы  $H'[i_1, \dots, i_s | j_1, \dots, j_s]$ . ►

**2°. Двойственный код, его проверочная и порождающая матрицы.** Пусть  $\mathbb{F}$  — конечное поле. Определим скалярное умножение векторов  $\mathbf{a} = (a_1, \dots, a_n), \mathbf{b} = (b_1, \dots, b_n) \in \mathbb{F}^n$  правилом  $\mathbf{a}\mathbf{b} = a_1b_1 + \dots + a_nb_n \in \mathbb{F}$ .

**Определение 4.9.** *Кодом, двойственным к линейному коду  $\mathcal{C} < \mathbb{F}^n$  называется код*

$$\mathcal{C}^\circ = \{\mathbf{b} \in \mathbb{F}^n : \mathbf{b}\mathcal{C} = 0\},$$

(под  $\mathbf{b}\mathcal{C} = 0$  понимается, что  $\mathbf{b}\mathbf{a} = 0$  для любого  $\mathbf{a} \in \mathcal{C}$ ).

**Теорема 4.10.** Пусть  $\mathcal{C}$  — линейный  $[n, k]$ -код над полем  $\mathbb{F}$  с порождающей матрицей  $G$  и проверочной матрицей  $H$ . Тогда

- 1)  $\mathcal{C}^\circ$  есть линейный  $[n, n-k]$ -код над  $\mathbb{F}$  с порождающей матрицей  $H$  и проверочной матрицей  $G$ ;
- 2)  $\mathcal{C}^{\circ\circ} = \mathcal{C}$ ;
- 3) для любого линейного кода  $\mathcal{L} \leq \mathbb{F}^n$  справедливы равенства

$$(\mathcal{C} + \mathcal{L})^\circ = \mathcal{C}^\circ \cap \mathcal{L}^\circ, \quad (\mathcal{C} \cap \mathcal{L})^\circ = \mathcal{C}^\circ + \mathcal{L}^\circ.$$

◀ 1) Условие  $\mathbf{b}\mathcal{C} = 0$  эквивалентно системе линейных уравнений  $G\mathbf{b}^T = 0$ . Поэтому матрица  $G$  будет проверочной для кода  $\mathcal{C}^\circ$ . Соответственно, из теоремы 4.5 получаем, что  $H$  — его порождающая матрица и  $\dim \mathcal{C}^\circ = n - k$ .

2) Получается из 1) повторным применением теоремы 4.5.

3)  $(\mathcal{C} + \mathcal{L})^\circ = \{\mathbf{b} \in \mathbb{F}^n : \mathbf{b}(\mathcal{C} + \mathcal{L}) = 0\}$ . В частности,  $\mathcal{C}, \mathcal{L} \subseteq \mathcal{C} + \mathcal{L}$ ,  $\mathbf{b}\mathcal{C} = 0$  и  $\mathbf{b}\mathcal{L} = 0$ , поэтому  $(\mathcal{C} + \mathcal{L})^\circ \subseteq \mathcal{C}^\circ \cap \mathcal{L}^\circ$ . Обратно, если  $\mathbf{b} \in \mathcal{C}^\circ \cap \mathcal{L}^\circ$ , то  $\mathbf{b}\mathcal{C} = 0$  и  $\mathbf{b}\mathcal{L} = 0$ , значит,  $\mathbf{b}(\mathcal{C} + \mathcal{L}) = 0$  и  $(\mathcal{C} + \mathcal{L})^\circ \supseteq \mathcal{C}^\circ \cap \mathcal{L}^\circ$ . Второе утверждение доказывается аналогично. ►

Утверждение (1) теоремы 4.10 является эквивалентным определением двойственного кода.

**Предложение 4.11.** Пусть  $\mathcal{C}$  — линейный  $[n, k, n-k+1]$  МДР код над полем  $\mathbb{F}$ . Тогда  $\mathcal{C}^\circ$  есть линейный  $[n, n-k, k+1]$  МДР код над  $\mathbb{F}$ .

◀ Можно считать, что  $\mathcal{C}$  имеет проверочную матрицу стандартного вида. Тогда по предложению 4.8 в матрице  $H'$  все квадратные подматрицы невырождены. По теореме 4.10 матрица  $G = (E|(H')^T)$  является проверочной для кода  $\mathcal{C}^\circ$ . В матрице  $(H')^T$  все квадратные подматрицы тоже невырождены, значит по предложению 4.8 код  $\mathcal{C}^\circ$  также является МДР кодом. ▶

**Определение 4.12.** Линейный код  $\mathcal{C} < \mathbb{F}^n$  называется *самоортogonalным*, если  $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{C}^\circ$ , и *самодвойственным*, если  $\mathcal{C} = \mathcal{C}^\circ$ .

**Предложение 4.13.** Пусть  $\mathcal{C}$  — линейный  $[n, k]$  самодвойственный код над полем  $\mathbb{F}$ . Тогда  $n$  обязательно чётное число и  $k = \frac{n}{2}$ .

◀ Имеем  $\mathcal{C} = \mathcal{C}^\circ$ , значит  $k = \dim \mathcal{C} = \dim \mathcal{C}^\circ$ . С другой стороны, по теореме 4.10  $\dim \mathcal{C}^\circ = n - k$ . Откуда,  $n - k = k$ , или  $n = 2k$ . ▶

**3°. Код, двойственный к обобщённому коду Рида–Соломона.** Пусть  $\mathbb{F}$  — конечное поле,  $q = |\mathbb{F}|$ ,  $M = \mathbb{F}[x|k] = \{f(x) \in \mathbb{F}[x] : \deg f(x) < k\}$ ,  $x_1, \dots, x_n$  — различные элементы поля  $\mathbb{F}$ , где  $n \geq k$ .  $u_1, \dots, u_n$  — обратимые элементы  $\mathbb{F}$ , отображение  $\varphi : \mathbb{F}[x|k] \rightarrow \mathbb{F}^n$  задано правилом

$$\varphi(f(x)) = (u_1 f(x_1), \dots, u_n f(x_n)).$$

Напомним, что образ  $\varphi(\mathbb{F}[x|k])$  называется *обобщённым  $[n, k]$ -кодом Рида–Соломона* над полем  $\mathbb{F}$ . Обозначим его  $GRS_q(n, k)$ . Его порождающая матрица имеет вид

$$G = \begin{pmatrix} u_1 & u_2 & \dots & u_n \\ u_1 x_1 & u_2 x_2 & \dots & u_n x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ u_1 x_1^{k-1} & u_2 x_2^{k-1} & \dots & u_n x_n^{k-1} \end{pmatrix}.$$

**Предложение 4.14.**  $GRS_q(n, k)^\circ = GRS_q(n, n - k)$ .

◀ Рассмотрим элементы

$$y_i = \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n (x_i - x_j)^{-1}, \quad v_i = y_i u_i^{-1} \in \mathbb{F}^*, \quad i = 1, \dots, n,$$

и матрицу

$$H = \begin{pmatrix} v_1 & v_2 & \dots & v_n \\ v_1 x_1 & v_2 x_2 & \dots & v_n x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ v_1 x_1^{n-k-1} & v_2 x_2^{n-k-1} & \dots & v_n x_n^{n-k-1} \end{pmatrix}.$$

Код с порождающей матрицей  $H$  является кодом  $GRS_q(n, n-k)$ . Достаточно показать, что  $H$  — проверочная для кода  $GRS_q(n, k)$ , поскольку по теореме 4.10 это доказывает, что она порождающая для двойственного кода. По построению очевидно, что  $\text{rk}H = n-k$ , следовательно, достаточно доказать равенство  $HG^T = 0$ .

Элемент на позиции  $(s, t)$  матрицы  $HG^T$  равен

$$\sum_{i=1}^n v_i x_i^{s-1} u_i x_i^{t-1} = \sum_{i=1}^n y_i x_i^{s+t-2}.$$

Возьмём матрицу Вандермонда

$$V = V(x_1, \dots, x_n) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_1 & x_2 & \dots & x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \dots & x_n^{n-1} \end{pmatrix}.$$

Имеем  $|V| = \prod_{1 \leq s < t \leq n} (x_t - x_s)$ , алгебраические дополнения элементов последней строки этой матрицы имеют вид

$$V_{n,j} = (-1)^{n+j} \prod_{\substack{1 \leq s < t \leq n \\ s, t \neq j}} (x_t - x_s).$$

Отметим, что

$$\frac{V_{n,i}}{|V|} = \prod_{\substack{s=1 \\ s \neq i}}^n (x_i - x_s)^{-1} = y_i.$$

Откуда

$$\sum_{i=1}^n y_i x_i^{s+t-2} = |V|^{-1} \sum_{i=1}^n x_i^{s+t-2} V_{n,i} = 0 \quad -$$

фальшивое разложение определителя Вандермонда (элементы взяты из строки с номером  $s+t-1 \leq n-1$ , а алгебраические дополнения

для  $n$ -ой строки.) ►

#### 4°. Код, двойственный к двоичному коду Хэмминга.

**Определение 4.15.** Код  $\mathcal{M}_2(l)$ , двойственный к двоичному коду Хэмминга  $\mathcal{H}_2(l)$ , называется *кодом Макдональда*.

**Предложение 4.16.** Код Макдональда  $\mathcal{M}_2(l)$ , двойственный к двоичному коду Хэмминга  $\mathcal{H}_2(l)$ , является линейным эквидистантным  $[n, l, 2^{l-1}]_2$ -кодом, лежащим на границе Плоткина.

◀ Линейность очевидна по построению. Поскольку матрица  $H$ , проверочная для кода Хэмминга, содержит все ненулевые столбцы высоты  $l$ , то  $\dim \mathcal{M}_2(l) = \text{rk}H = l$ .

Вычислим расстояние кода  $\mathcal{M}_2(l)$  и докажем его эквидистантность. Поскольку матрица  $H$  содержит все столбцы высоты  $l$ , кроме нулевого, то любая её строка содержит в точности  $\frac{2^l}{2} = 2^{l-1}$  единиц. Проведем дальнейшее доказательство индукцией по  $l$ .

*База индукции.* При  $l = 1$  имеем  $n = 1$ ,  $H = (1)$  и слово  $(1)$  веса 1 является единственным ненулевым словом в коде  $\mathcal{M}_2(1)$ .

*Шаг индукции.* Пусть  $l > 1$  и для всех  $m < l$  утверждение верно. Пусть  $H'$  — порождающая матрица кода  $\mathcal{M}_2(l-1)$ , составленная из всех ненулевых столбцов высоты  $l-1$ . Обозначим  $\mathbf{0} = (0, \dots, 0)$ ,  $\mathbf{1} = (1, \dots, 1)$ . Тогда  $H = \begin{pmatrix} H' & \mathbf{0}^T & H' \\ \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{1} \end{pmatrix}$  (ненулевой столбец высоты  $l$  можно получить либо из ненулевого столбца высоты  $l-1$  приписыванием 0 или 1, либо единицу можно также приписать к нулевому столбцу).

Любое ненулевое слово  $\mathbf{a} \in \mathcal{M}_2(l)$  — сумма некоторых строк матрицы  $H$ . Если в сумме не участвует последняя строка, то  $\mathbf{a} = (\mathbf{a}', 0, \mathbf{a}')$ , где  $\mathbf{a}' \in \mathcal{M}_2(l-1) \setminus \{0\}$ . По предположению индукции  $\|\mathbf{a}'\| = 2^{l-2}$ , соответственно,  $\|\mathbf{a}\| = 2\|\mathbf{a}'\| = 2^{l-1}$ . В противном случае,  $\mathbf{a} = (\mathbf{a}', 0, \mathbf{a}') + (\mathbf{0}, 1, \mathbf{1})$ . Заметим, что  $\|\mathbf{a}' + \mathbf{1}\| = 2^{l-1} - 1 - \|\mathbf{a}'\|$ . Откуда,  $\|\mathbf{a}\| = \|\mathbf{a}'\| + 1 + 2^{l-1} - 1 - \|\mathbf{a}'\| = 2^{l-1}$ . Следовательно, веса всех ненулевых слов линейного кода  $\mathcal{M}_2(l)$  одинаковы, поэтому он является эквидистантным кодом с минимальным расстоянием  $d = 2^{l-1}$ .

Вспомним, что код лежит на границе Плоткина, если  $d = \frac{q-1}{q} \frac{|C|}{|C|-1} n$ . В данном случае  $q = 2$ ,  $n = 2^l - 1$ ,  $|\mathcal{M}_2(l)| = 2^l$ , отку-

да

$$\frac{q-1}{q} \frac{|\mathcal{C}|}{|\mathcal{C}|-1} n = \frac{2^l}{2(2^l-1)} \cdot (2^1-1) = 2^{l-1} = d(\mathcal{M}_2(l)).$$

►

Заметим, что  $|\mathcal{M}_2(l)| = 2^l = n+1$ . Оказывается, что мощность кода Макдональда является максимально возможной среди любых эквидистантных линейных  $n$ -кодов.

**Теорема 4.17.** Пусть  $\mathcal{C}$  — эквидистантный линейный код в  $\mathbb{F}_2^n$ , тогда  $|\mathcal{C}| \leq n+1$ .

◀ Пусть  $\mathcal{C} = \{\mathbf{c}_1, \dots, \mathbf{c}_s\}$ , и при этом  $d(\mathbf{c}_i, \mathbf{c}_j) = d$ , для всех  $i \neq j$ . Для любых различных  $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \{0, 1\}^n$  имеем

$$d(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \sum_{i=1}^n |a_i - b_i| = \sum_{i=1}^n (a_i - b_i)^2 = \|\mathbf{a}\| + \|\mathbf{b}\| - 2\mathbf{a}\mathbf{b}$$

(все вычисления, в частности, модуля и скалярного произведения выполняются над  $\mathbb{R}$ ). Откуда для  $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathcal{C} \setminus \{0\}$  получаем, что  $d = 2d - 2\mathbf{a}\mathbf{b}$  и  $\mathbf{a}\mathbf{b} = \frac{d}{2}$ . Без ограничения общности можно считать, что  $\mathbf{c}_1 = 0$ .

Вычислим определитель Грама для векторов  $\mathbf{c}_2, \dots, \mathbf{c}_s$  как векторов в  $\mathbb{R}^n$  (для  $(0, 1)$ -векторов вес Хэмминга совпадает со скалярным квадратом):

$$\begin{vmatrix} d & \frac{d}{2} & \dots & \frac{d}{2} \\ \frac{d}{2} & d & \dots & \frac{d}{2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{d}{2} & \frac{d}{2} & \dots & d \end{vmatrix} = \frac{d^{s-1}}{2^{s-1}} \begin{vmatrix} 2 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 2 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \dots & 2 \end{vmatrix} = \frac{d^{s-1}}{2^{s-1}} s \neq 0,$$

т.е.  $\mathbf{c}_2, \dots, \mathbf{c}_s$  линейно независимы над  $\mathbb{R}$ .

Итак, имеем  $s-1$  линейно независимых векторов. В пространстве  $\mathbb{R}^n$  может быть не более  $n$  линейно независимых векторов, значит,  $s-1 \leq n$  и  $s \leq n+1$ . ►

#### Задачи к лекции 4.

**Задача 1.** Приведите примеры матриц  $A, B$  без нулевых столбцов, для которых  $\varkappa A = \text{rk}A$ ,  $\varkappa B < \text{rk}B$ .

**Задача 2.** (Критерий миноров над кольцом, обобщение предложения 4.8) Докажите, что если  $G — k \times n$  матрица над кольцом  $\mathcal{R}$  и все миноры порядка  $k$  матрицы  $G$  обратимы в  $\mathcal{R}$ , то код с порождающей матрицей  $G$  является МДР-кодом.

**Задача 3.** Покажите, что в предыдущей задаче условие “миноры порядка  $k$  не равны нулю” не достаточно: приведите пример  $[n, k]$  не МДР-кода над  $\mathbb{Z}_6$ , так что все миноры порядка  $k$  его порождающей матрицы  $G$  ненулевые.

**Задача 4.** Приведите пример самодвойственного кода.

**Задача 5.** Приведите пример самоортогонального кода, не являющегося самодвойственным.

**Задача 6.** Возможно ли подобрать параметры  $q, n, k, x_1, \dots, x_n, u_1, \dots, u_n$  так, чтобы код  $GRS_q(n, k)$  был самодвойственным?

## Лекция 5. Построение новых кодов из заданных. Граница Грайсмера.

### 1°. Добавление констант

**Определение 5.1.** Код  $\mathcal{C} \subseteq \mathbb{F}^n$  содержит константы, если он содержит все слова вида  $(a, \dots, a)$ ,  $a \in \mathbb{F}$ . Для линейного кода это условие равносильно включению  $\mathbf{1} = (1, \dots, 1) \in \mathcal{C}$ .

**Определение 5.2.** Для произвольных  $\alpha \in \mathbb{F}$  и  $\mathbf{a} \in \mathbb{F}^n$  обозначим через  $s_\alpha(\mathbf{a})$  количество координат в слове  $\mathbf{a}$ , равных  $\alpha$ . Также положим  $s_{\max} = \max\{s_\alpha(\mathbf{a}) : \mathbf{a} \in \mathcal{C} \setminus \{0\}, \alpha \in \mathbb{F}\}$ .

**Определение 5.3.** Пусть  $\mathcal{C} \leq \mathbb{F}^n$  — линейный код, не содержащий констант. Тогда говорят, что код  $\mathcal{C}^c = \mathcal{C} + \mathbb{F}\mathbf{1}$  получен из кода  $\mathcal{C}$  добавлением констант. Заметим, что добавление констант к коду равносильно приписыванию строки  $\mathbf{1}$  к его порождающей матрице.

**Предложение 5.4.** Пусть  $\mathcal{C} \leq \mathbb{F}^n$  — линейный  $[n, k, d]_q$ -код, не содержащий констант. Тогда код  $\mathcal{C}^c = \mathcal{C} + \mathbb{F}\mathbf{1}$  есть линейный  $[n, k + 1, d']_q$ -код с расстоянием  $d' = n - s_{\max} \leq d$ .

◀ По построению код  $\mathcal{C}^c$  есть линейный  $[n, k + 1]_q$ -код. Вычислим его расстояние.

Произвольное слово  $\mathbf{b} \in \mathcal{C}^c$  представляется в виде  $\mathbf{b} = \mathbf{a} - \alpha\mathbf{1}$ , где  $\mathbf{a} \in \mathcal{C}$ ,  $\alpha \in \mathbb{F}$ . По построению  $\|\mathbf{b}\| = n - s_\alpha(\mathbf{a}) \geq n - s_{\max}$ . Выражение  $n - s_{\max} \geq 1$  в силу того, что код  $\mathcal{C}$  не содержит констант. Откуда видно, что  $d' \geq n - s_{\max}$ . Выбирая такие  $\mathbf{a} \in \mathcal{C} \setminus \{0\}$  и  $\alpha \in \mathbb{F}$ , что  $s_{\max} = s_\alpha(\mathbf{a})$ , получаем, что  $\|\mathbf{b}\| = n - s_{\max}$  и  $d' = n - s_{\max}$ .

Неравенство  $d' \leq d$  следует из включения  $\mathcal{C} \leq \mathcal{C}^c$ . ▶

### 2°. Добавление проверки на чётность

**Определение 5.5.** Код  $\mathcal{C} \subseteq \mathbb{F}^n$  содержит проверку на чётность, если его двойственный код  $\mathcal{C}^\circ$  содержит слово  $\mathbf{1}$ .

**Определение 5.6.** Пусть  $\mathcal{C} \leq \mathbb{F}^n$  — линейный  $[n, k, d]_q$ -код с проверочной матрицей  $H$  размера  $l \times n$ . Тогда говорят, что код  $\widehat{\mathcal{C}} \leq \mathbb{F}^{n+1}$  с проверочной матрицей

$$\widehat{H} = \begin{pmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{1} \\ H & \mathbf{0}^T \end{pmatrix}$$

получен из кода  $\mathcal{C}$  добавлением проверки на чётность.

**Предложение 5.7.** Пусть  $\mathcal{C} \leq \mathbb{F}^n$  — линейный  $[n, k, d]_q$ -код с проверочной матрицей  $H$  размера  $l \times n$ . Тогда линейный код  $\widehat{\mathcal{C}} \leq \mathbb{F}^{n+1}$ , полученный из кода  $\mathcal{C}$  добавлением проверки на чётность, есть линейный  $[n+1, k, \widehat{d}]_q$ -код с расстоянием  $\widehat{d} \in \{d, d+1\}$ . Если код  $\mathcal{C}$  содержит проверку на чётность, то  $\widehat{d} = d$ .

◀ По построению  $\text{rk}\widehat{H} = \text{rk}H + 1$ , поэтому  $\dim\widehat{\mathcal{C}} = n + 1 - \text{rk}\widehat{H} = n - \text{rk}H = k$ .

Вычислим расстояние кода  $\widehat{\mathcal{C}}$ . Вспомним, что  $d(\widehat{\mathcal{C}}) = \varkappa(\widehat{H}) + 1$ . Заметим, что любые  $\varkappa(H)$  столбцов матрицы  $\widehat{H}$  линейно независимы, поскольку любые  $\widehat{H}$  из первых  $n$  столбцов получены приписыванием 1 к линейно независимым столбцам матрицы  $H$ , а последний столбец не выражается через остальные, если они также линейно независимы.

С другой стороны, если мы возьмём в матрице  $\widehat{H}$   $\varkappa(H) + 1$  столбцов из первых  $n$  так, что соответствующие столбцы линейно зависимы в  $H$ , то их линейная комбинация с теми же коэффициентами даст столбец, пропорциональный последнему. Следовательно, в матрице  $\widehat{H}$  есть  $\varkappa(H) + 2$  линейно зависимых столбца, и  $\varkappa(\widehat{H}) \leq \varkappa(H) + 1$ . Таким образом,  $d \leq \widehat{d} \leq d + 1$ . ▶

**Следствие 5.8.** Если  $q = 2$  и  $d$  нечётно, то  $\widehat{d} = d + 1$ .

◀ Если  $q = 2$ , то все слова кода  $\widehat{\mathcal{C}}$  имеют чётный вес, поэтому  $\widehat{d}$  чётно, значит не равно  $d$  в данном случае. ▶

### 3°. Расширение кода

**Определение 5.9.** Пусть  $\mathcal{C} \leq \mathbb{F}^n$  — линейный  $[n, k, d]_q$ -код. Тогда про код  $\mathcal{C}^{ext}$ , полученный из кода  $\mathcal{C}$  добавлением констант и проверки на чётность, говорят, что он есть *расширение кода  $\mathcal{C}$*  или *расширенный код  $\mathcal{C}$* .

**Следствие 5.10.** Пусть  $\mathcal{C} \leq \mathbb{F}^n$  — линейный  $[n, k, d]_q$ -код, не содержащий констант. Тогда код  $\mathcal{C}^{ext}$  есть линейный  $[n+1, k+1, d^{ext}]_q$ -код, где  $d^{ext} = n - s_{\max} + \delta$ ,  $\delta \in \{0, 1\}$ .

### 4°. Декартово произведение кодов

**Определение 5.11.** Пусть  $\mathcal{C}_i$  — линейные  $[n_i, k_i, d_i]_q$ -коды над полем  $\mathbb{F}$ ,  $i = 1, \dots, m$ . Тогда о коде

$$\mathcal{C} = \mathcal{C}_1 \times \dots \times \mathcal{C}_m \leq \mathbb{F}^{n_1 + \dots + n_m},$$

состоящем из всех слов вида  $(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_m)$ ,  $\mathbf{a}_i \in \mathcal{C}_i$ ,  $i = 1, \dots, m$ , говорят как о *декартовом произведении кодов*  $\mathcal{C}_1, \dots, \mathcal{C}_m$ . При этом коды  $\mathcal{C}_i$  называют *компонентами* кода  $\mathcal{C}$ .

**Предложение 5.12.** Код  $\mathcal{C}$  есть  $[n_1 + \dots + n_m, k_1 + \dots + k_m, d]_q$ -код для  $d = \min\{d_1, \dots, d_m\}$ .  $\mathcal{C}$  — линейный код тогда и только тогда, когда все его компоненты линейны. При этом проверочная матрица кода  $\mathcal{C}$  задаётся равенством

$$H = \begin{pmatrix} H_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & H_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & H_m \end{pmatrix},$$

где  $H_i$  — проверочная матрица кода  $\mathcal{C}_i$ ,  $i = 1, \dots, m$ .

## 5°. Тензорное произведение кодов

**Определение 5.13.** Тензорным произведением матриц  $A \in M_{m,n}(\mathbb{F})$  и  $B \in M_{k,l}(\mathbb{F})$  называется матрица

$$A \otimes B = \begin{pmatrix} a_{11}B & \dots & a_{1n}B \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1}B & \dots & a_{mn}B \end{pmatrix} \in M_{mk, nl}(\mathbb{F}).$$

**Определение 5.14.** Пусть  $\mathcal{C}_i$  — линейные  $[n_i, k_i, d_i]_q$ -коды над полем  $\mathbb{F}$ ,  $i = 1, 2$ . Тензорным произведением кодов  $\mathcal{C}_1$  и  $\mathcal{C}_2$  называется код  $\mathcal{C} = \mathcal{C}_1 \otimes \mathcal{C}_2 \in \mathbb{F}^{n_1 n_2}$ , порождённый всеми словами вида

$$\mathbf{a} \otimes \mathbf{b}, \quad \mathbf{a} \in \mathcal{C}_1, \mathbf{b} \in \mathcal{C}_2$$

(под тензорным произведением кодовых слов понимается их произведение как  $1 \times n_i$  матриц).

**Предложение 5.15.** Пусть  $\mathcal{C}_i$  — линейные  $[n_i, k_i, d_i]_q$ -коды над полем  $\mathbb{F}$ , с порождающими матрицами  $G^{(i)} \in M_{k_i, n_i}$  и проверочными матрицами  $H^{(i)} \in M_{n_i - k_i, n_i}$ ,  $i = 1, 2$ . Тогда код  $\mathcal{C} = \mathcal{C}_1 \otimes \mathcal{C}_2$

есть линейный  $[n_1 n_2, k_1 k_2, d_1 d_2]_q$ -код с порождающей матрицей  $G = G^{(1)} \otimes G^{(2)}$  и проверочной матрицей  $H = \begin{pmatrix} H^{(1)} \otimes E_{n_2} \\ E_{n_1} \otimes H^{(2)} \end{pmatrix}$ .

◀ Пусть  $G^{(i)} = \begin{pmatrix} \mathbf{a}_1^{(i)} \\ \vdots \\ \mathbf{a}_{k_i}^{(i)} \end{pmatrix}$ ,  $i = 1, 2$ . Любое слово кода  $\mathcal{C}$  линейно выра-

жается через множество слов  $\mathbf{a}_r^{(1)} \otimes \mathbf{a}_s^{(2)}$ ,  $r = 1, \dots, k_1$ ,  $s = 1, \dots, k_2$ . Эти слова составляют множество строк матрицы  $G$ , следовательно она является порождающей матрицей кода  $\mathcal{C}$ . ▶

По свойству тензорного произведения  $\dim \mathcal{C} = \text{rk} G = \text{rk} G^{(1)} \cdot \text{rk} G^{(2)} = k_1 k_2$ .

Вычислим расстояние кода  $\mathcal{C}$ . Для этого рассмотрим изоморфизм  $\varphi : \mathbb{F}^{n_1 n_2} \rightarrow M_{n_1, n_2}(\mathbb{F})$  линейных пространств, сопоставляющий любому слову  $\mathbf{c} = (c_1, \dots, c_{n_1 n_2})$  матрицу

$$\varphi(\mathbf{c}) = \begin{pmatrix} c_1 & \dots & c_{n_2} \\ \vdots & & \vdots \\ c_{(n_1-1)n_2+1} & \dots & c_{n_1 n_2} \end{pmatrix}.$$

Тогда для любых  $\mathbf{a} \in \mathcal{C}_1$ ,  $\mathbf{b} \in \mathcal{C}_2$  слову

$$\mathbf{a} \otimes \mathbf{b} = (a_1 b_1, \dots, a_1 b_{n_2}, a_2 b_1, \dots, a_2 b_{n_2}, \dots, a_{n_1} b_1, \dots, a_{n_1} b_{n_2}) \in \mathcal{C}$$

соответствует матрица

$$\varphi(\mathbf{a} \otimes \mathbf{b}) = \begin{pmatrix} a_1 b_1 & a_1 b_2 & \dots & a_1 b_{n_2} \\ a_2 b_1 & a_2 b_2 & \dots & a_2 b_{n_2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n_1} b_1 & a_{n_1} b_2 & \dots & a_{n_1} b_{n_2} \end{pmatrix},$$

столбцы которой принадлежат коду  $\mathcal{C}_1$ , а строки —  $\mathcal{C}_2$ . По линейности это верно для любой матрицы из пространства  $\varphi(\mathcal{C})$ . Следовательно, если  $M \in \varphi(\mathcal{C}) \setminus \{0\}$ , то в  $M$  есть столбец с весом не менее  $d_1$ , а значит есть не менее  $d_1$  ненулевой строки. Вес каждой из этих строк не менее  $d_2$ , поэтому в матрице  $M$  не менее  $d_1 d_2$  ненулевых элементов. Значит, столько же ненулевых элементов содержит кодовое слово  $\mathbf{c} = \varphi^{-1}(M) \in \mathcal{C} \setminus \{0\}$  и  $\|\mathbf{c}\| \geq d_1 d_2$ . Таким образом,  $d(\mathcal{C}) \geq d_1 d_2$ . Выбирая  $\mathbf{a} \in \mathcal{C}_1$ ,  $\mathbf{b} \in \mathcal{C}_2$  так, что  $\|\mathbf{a}\| = d_1$ ,  $\|\mathbf{b}\| = d_2$  получаем, что  $\|\mathbf{a} \otimes \mathbf{b}\| = d_1 d_2$ . Следовательно,  $d(\mathcal{C}) = d_1 d_2$ . Осталось найти проверочную матрицу кода  $\mathcal{C}$ .

Условие  $HG^T = 0$  выполнено по определению матриц  $G$  и  $H$ . Пусть для слова  $\mathbf{c} \in \mathbb{F}^{n_1 n_2}$  выполнено равенство  $H\mathbf{c}^T = 0$ . Тогда для матрицы  $M = \varphi(\mathbf{c})$  это означает, что выполнены равенства  $H^{(1)}M = 0, H^{(2)}M^T = 0$ . Из условия  $H^{(2)}M^T = 0$  следует, что строки матрицы  $M$  являются линейными комбинациями строк матрицы  $G^{(2)}$ , поэтому  $M = UG^{(2)}$  для некоторой матрицы  $U \in M_{n_1, k_2}(\mathbb{F})$ . Тогда  $H^{(1)}M = H^{(1)}UG^{(2)} = 0$ . Поскольку строки матрицы  $G^{(2)}$  линейно независимы отсюда следует, что  $H^{(1)}U = 0$ . Это означает, что столбцы матрицы  $U$  принадлежат коду  $\mathcal{C}_1$  и линейно выражаются через столбцы матрицы  $G^{(1)}$ . Тогда из равенства  $M = UG^{(2)}$  заключаем, что матрица  $M$  является линейной комбинацией матриц  $(\mathbf{a}_r^{(1)})^T \cdot \mathbf{a}_s^{(2)}$ , а её прообраз слово  $\mathbf{c}$  — линейной комбинацией слов  $\mathbf{a}_r^{(1)} \otimes \mathbf{a}_s^{(2)}$ ,  $r = 1, \dots, k_1, s = 1, \dots, k_2$ , базисных для кода  $\mathcal{C}$ . Таким образом,  $\mathbf{c} \in \mathcal{C}$ . Значит, однородной системе с матрицей  $H$  удовлетворяют слова кода  $\mathcal{C}$  и только они, поэтому  $H$  — проверочная матрица этого кода.

## 6°. Гибридный код

**Определение 5.16.** Пусть  $\mathcal{C}_i$  — линейные  $[n, k_i, d_i]_q$ -коды над полем  $\mathbb{F}$ ,  $i = 1, 2$ . Гибридом кодов  $\mathcal{C}_1$  и  $\mathcal{C}_2$  называется код  $\mathcal{C} = \mathcal{C}_1 \dashv \mathcal{C}_2 \in \mathbb{F}^{2n}$ , состоящий из всех слов вида

$$(\mathbf{a}, \mathbf{a} + \mathbf{b}), \mathbf{a} \in \mathcal{C}_1, \mathbf{b} \in \mathcal{C}_2.$$

**Предложение 5.17.** Пусть  $\mathcal{C}_i$  — линейные  $[n, k_i, d_i]_q$ -коды над полем  $\mathbb{F}$ ,  $i = 1, 2$ . Тогда код  $\mathcal{C} = \mathcal{C}_1 \dashv \mathcal{C}_2$  есть линейный  $[2n, k_1 + k_2, d]_q$ -код с  $d = \min\{2d_1, d_2\}$ .

◀ По построению очевидно, что  $\mathcal{C}$  есть линейный  $[2n, k_1 + k_2]_q$ -код. Вычислим его расстояние. Сразу видно, что  $d \leq \min\{2d_1, d_2\}$ , поскольку в  $\mathcal{C}$  есть слова  $(\mathbf{a}, \mathbf{a})$  и  $(0, \mathbf{b})$  с  $\|\mathbf{a}\| = d_1$  и  $\|\mathbf{b}\| = d_2$ .

С другой стороны по неравенству треугольника получаем, что

$$\|(\mathbf{a}, \mathbf{a} + \mathbf{b})\| = \|\mathbf{a}\| + \|\mathbf{a} + \mathbf{b}\| \geq \|\mathbf{a}\| + \|\mathbf{a}\| - \|\mathbf{b}\|.$$

Если  $\mathbf{a} = 0$ , то вес такого слова не меньше  $d_2$ .

Пусть  $\mathbf{a} \neq 0$ . Если  $\|\mathbf{b}\| \geq \|\mathbf{a}\| (> 0)$ , то  $\|\mathbf{a}\| + \|\mathbf{a}\| - \|\mathbf{b}\| = \|\mathbf{b}\| \geq d_2$ . Пусть  $0 < \|\mathbf{b}\| < \|\mathbf{a}\|$ . Имеем  $\|(\mathbf{a}, \mathbf{a} + \mathbf{b})\| \geq \|\mathbf{a}\| > \|\mathbf{b}\| \geq d_2$ , иначе  $\mathbf{b} = 0$  и  $\|(\mathbf{a}, \mathbf{a})\| \geq 2d_1$ . ▶

## 7°. Увеличение размерности с сохранением расстояния

**Предложение 5.18.** Пусть  $\mathcal{C}$  — линейный  $[n, k, d]_q$ -код над полем  $\mathbb{F}$  и  $\mathbf{b} \in \mathbb{F}^n \setminus \mathcal{C}$  — слово, расстояние от которого до любого слова из кода  $\mathcal{C}$  не меньше, чем  $d - 1$ . Тогда код  $\mathcal{C}'$ , состоящий из всех слов вида

$$(\mathbf{a} + \alpha \mathbf{b}, \alpha), \quad \mathbf{a} \in \mathcal{C}, \alpha \in \mathbb{F},$$

есть линейный  $[n + 1, k + 1, d]$ -код. Если  $G$  — порождающая матрица кода  $\mathcal{C}$ , то порождающей для  $\mathcal{C}'$  будет, например, матрица  $G' = \begin{pmatrix} G & \mathbf{0}^T \\ \mathbf{b} & 1 \end{pmatrix}$ .

### 8°. Граница Грайсмера.

Далее будем использовать обозначение  $\lceil x \rceil = \min\{i \in \mathbb{Z} : i \geq x\}$ . Легко проверить, что если  $a, b \in \mathbb{R}$  и  $c \in \mathbb{N}$ , то

$$\left\lceil \frac{a}{bc} \right\rceil = \left\lceil \frac{\left\lceil \frac{a}{b} \right\rceil}{c} \right\rceil. \quad (5.1)$$

Действительно, для любого  $i \in \mathbb{Z}$  имеем

$$i \geq \frac{a}{bc} \Leftrightarrow ic \geq \frac{a}{b} \Leftrightarrow ic \geq \left\lceil \frac{a}{b} \right\rceil \Leftrightarrow i \geq \frac{\left\lceil \frac{a}{b} \right\rceil}{c}.$$

**Теорема 5.19** (Граница Грайсмера). Пусть  $\mathcal{C}$  — линейный  $[n, k, d]_q$ -код над полем  $\mathbb{F}$ . Тогда

$$n \geq \sum_{i=0}^{k-1} \left\lceil \frac{d}{q^i} \right\rceil. \quad (5.2)$$

◀ 1. Обозначим через  $N_q(k, d)$  наименьшее число  $N$ , для которого существует линейный код над  $\mathbb{F}$  длины  $N$  размерности  $k$ , расстояние которого не меньше  $d$ . Заметим, что это определение корректно: достаточно рассмотреть код длины  $kd$ , состоящий из всех слов вида

$$\underbrace{(\alpha_1, \dots, \alpha_1)}_{d \text{ раз}}, \underbrace{(\alpha_2, \dots, \alpha_2)}_{d \text{ раз}}, \dots, \underbrace{(\alpha_k, \dots, \alpha_k)}_{d \text{ раз}}, \quad \alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{F}.$$

Еще заметим, что функция  $N_q(k, d)$  монотонна по второму аргументу:  $N_q(k, d) \leq N_q(k, \tilde{d})$  при  $d \leq \tilde{d}$ .

2. Докажем следующее неравенство:

$$N_q(k, d) \geq d + N_q\left(k - 1, \left\lceil \frac{d}{q} \right\rceil\right). \quad (5.3)$$

Пусть некоторый  $[n, k, \tilde{d}]_q$ -код с  $n = N_q(n, d)$  и  $\tilde{d} \geq d$  задаётся порождающей матрицей  $G$  ранга  $k$ , первая строка которой имеет вес  $\tilde{d}$ . Переходя к линейно эквивалентному коду, можем считать, что матрица  $G$  состоит из  $k$  строк и имеет вид

$$\left( \begin{array}{c|c} \overbrace{0 \dots 0}^{n-\tilde{d}} & \overbrace{1 \dots 1}^{\tilde{d}} \\ \hline G' & G'' \end{array} \right).$$

Заметим, что  $\text{rk}G' = k - 1$ . Действительно, запишем строки матрицы  $G$  в виде  $a_i = (a'_i | a''_i)$ ,  $i = 1, \dots, k$ , где  $a'_i$  и  $a''_i$  — строки матриц  $G'$  и  $G''$ , причём  $a'_1 = 0$ . Допустим, что  $\sum_{i=2}^k \lambda_i a'_i = 0$  для некоторых  $\lambda_2, \dots, \lambda_k \in P$ . Положим  $b = \sum_{i=2}^k \lambda_i a''_i$ . Ясно, что для некоторого  $\lambda \in \mathbb{F}$  имеем  $\|b - \lambda a''_1\| < \tilde{d}$ . Следовательно,

$$\|-\lambda a_1 + \sum_{i=2}^k \lambda_i a_i\| = \|-\lambda(a'_1 | a''_1) + \sum_{i=2}^k \lambda_i(a'_i | a''_i)\| = \|(0 | b - \lambda a''_1)\| < \tilde{d},$$

откуда  $-\lambda a_1 + \sum_{i=2}^k \lambda_i a_i = 0$  и  $\lambda_2 = \dots = \lambda_k = 0$ .

Пусть теперь  $d'$  — минимальное расстояние кода  $C'$ , порождённого строками матрицы  $G'$ . Тогда в коде  $C$  содержится слово вида  $(a|b)$ , где  $\|a\| = d'$ . Но в слове  $b$  длины  $\tilde{d}$  над  $\mathbb{F}$  хотя бы один символ, скажем,  $\lambda$ , встречается не менее чем  $\left\lceil \frac{\tilde{d}}{q} \right\rceil$  раз (иначе число вхождений каждого символа меньше  $\tilde{d}/q$ , а сумма этих  $q$  чисел равна  $\tilde{d}$ ). Значит,  $\|b - \lambda a''_1\| \leq \tilde{d} - \left\lceil \frac{\tilde{d}}{q} \right\rceil$ . Имеем  $\tilde{d} \leq \|(a|b) - \lambda a_1\| = d' + \|b - \lambda a''_1\| \leq d' + \tilde{d} - \left\lceil \frac{\tilde{d}}{q} \right\rceil$ . Таким образом,  $d' \geq \left\lceil \frac{\tilde{d}}{q} \right\rceil \geq \left\lceil \frac{d}{q} \right\rceil$ , поэтому  $n - d \geq n - \tilde{d} \geq N_q(k - 1, d') \geq N_q\left(k - 1, \left\lceil \frac{d}{q} \right\rceil\right)$ , откуда сразу следует (5.3).

3. Теперь применим доказанное неравенство к  $[n, k, d]_q$ -коду

несколько раз. Имеем

$$\begin{aligned}
 n &\geq N_q(k, d) \geq d + N_q\left(k - 1, \left\lceil \frac{d}{q} \right\rceil\right) \geq \\
 &\geq d + \left\lceil \frac{d}{q} \right\rceil + N_q\left(k - 2, \left\lceil \frac{\left\lceil \frac{d}{q} \right\rceil}{q} \right\rceil\right) \stackrel{(5.1)}{=} \\
 &= d + \left\lceil \frac{d}{q} \right\rceil + N_q\left(k - 2, \left\lceil \frac{d}{q^2} \right\rceil\right) \geq \dots \geq \\
 &\geq d + \left\lceil \frac{d}{q} \right\rceil + \dots + \left\lceil \frac{d}{q^{k-2}} \right\rceil + N_q\left(1, \left\lceil \frac{d}{q^{k-1}} \right\rceil\right),
 \end{aligned}$$

откуда

следует утверждение теоремы, поскольку, очевидно,  $N_q(1, m) = m$  для любого натурального числа  $m$ . ►

## 9°. Уменьшение длины кода

**Предложение 5.20.** Пусть  $\mathcal{C}$  — линейный  $[n, k, d]_q$ -код над полем  $\mathbb{F}$  и  $\mathbf{c} \in \mathcal{C}$  — слово веса  $d$  с ненулевыми координатами в позициях  $i_1, \dots, i_d$ . Тогда код  $\overline{\mathcal{C}}$ , получающийся из кода  $\mathcal{C}$  вычеркиванием всех слов, пропорциональных  $\mathbf{c}$ , и вычёркиванием в остальных словах координат с номерами  $i_1, \dots, i_d$  есть линейный  $[n - d, k - 1, d_1]$ -код, где  $d_1 \geq \left\lceil \frac{d}{q} \right\rceil$ . Если  $\mathcal{C}$  — не МДР-код (т.е.  $d \leq n - k$ ), то двойственный к коду  $\overline{\mathcal{C}}$  код  $\overline{\mathcal{C}}^\circ$  есть  $[n - d, n - d - (k - 1), d_0]$ -код, где  $d_0 \geq d(\mathcal{C}^\circ)$ .

◀ Первое утверждение сразу следует из доказательства пункта 2 теоремы о границе Грайсмера.

Введённая в этом утверждении матрица  $G'$  будет проверочной для кода  $\overline{\mathcal{C}}^\circ$ , поэтому это линейный код длины  $n - d$  и размерности  $(n - d) - \text{rk}G' = (n - d) - (k - 1) \geq 1$ , т.к.  $d \leq n - k$ .

Пусть  $G$  — порождающая матрица кода  $\mathcal{C}$ , она же будет проверочной матрицей для кода  $\mathcal{C}^\circ$ . Тогда по предложению о связи расстояния кода и гарантируемого ранга имеем  $\varkappa(G) = d(\mathcal{C}^\circ) - 1$ . И поскольку код и двойственный к нему являются МДР-кодами одновременно, то  $\varkappa(G) < \text{rk}G = k$ . Таким образом, число  $\varkappa(G)$  не превосходит числа  $k - 1$  столбцов матрицы  $G'$ . С учётом этого, из строения матрицы  $G$  видно, что в матрице  $G'$  любые  $\varkappa(G)$  столбцов линейно независимы. Следовательно,  $\varkappa(G') \geq \varkappa(G)$ . В итоге получаем, что  $d_0 \geq d(\mathcal{C}^\circ)$ . ►

**Следствие 5.21.** Пусть  $\mathcal{C}$  — линейный МДР-код  $[n, k, d]_q$ -код над полем  $\mathbb{F}$  мощности  $q$  размерности  $k \geq 2$ . Тогда  $d \leq q$  и  $n \leq q + k - 1$ .

◀ Поскольку  $\mathcal{C}$  — МДР-код, то  $d = n - (k - 1)$  и  $n = d + k - 1$ . Поэтому в обозначениях предыдущего доказательства имеем, что матрица  $G'$  размера  $(k - 1) \times (k - 1)$  имеет  $\text{rk}G' = k - 1$ . Следовательно,  $\bar{\mathcal{C}} = \mathbb{F}^{k-1}$  и  $d_1 = 1$ . Откуда  $\left\lceil \frac{d}{q} \right\rceil \leq 1$ ,  $d \leq q$  и  $n \leq q + k - 1$ . ▶

### Задачи к лекции 5.

**Задача 1.** Определите кодовые параметры расширенного симплексного кода  $S_P(k)^{ext}$  (см. последний пример Лекции 1). Будет ли он лежать на границе Плоткина?

**Задача 2.** Определите кодовые параметры расширенного двоичного кода Хэмминга  $\mathcal{H}_2(l)^{ext}$ . Будет ли он совершенным кодом?

**Задача 3.** Докажите, что для любых матриц  $A \in M_{m,n}(\mathbb{F})$  и  $B \in M_{k,l}(\mathbb{F})$  выполнено  $\text{rk}(A \otimes B) = \text{rk}A \cdot \text{rk}B$ .

**Задача 4.** Приведите пример, когда тензорное произведение двух  $[n, k]$  МДР-кодов тоже является МДР-кодом?

**Задача 5.** Примените конструкцию из раздела 7 “Увеличение размерности с сохранением расстояния” к  $[n, k]$  коду Рида–Соломона  $\mathcal{C}$  с параметрами  $x_1 = 0, x_2, \dots, x_n$  — различные ненулевые элементы поля  $\mathbb{F}$ ,  $u_1 = \dots = u_n = 1$  и слову  $\mathbf{b} = (0, x_1^k, \dots, x_n^k)$ .

**Задача 6.** При каких значениях  $k$  код  $\mathcal{C}'$  из предыдущей задачи является МДР-кодом?

**Задача 7.** Приведите пример кода, лежащего на границе Грайсмера.

**Лекция 6. Основные понятия теории колец. Локальные кольца, эквивалентные определения. Разложение конечного коммутативного кольца в прямую сумму локальных колец. Аннуляторы идеала в модуле и подмодуля в кольце. Лемма Накаямы. Радикал Джекобсона конечного коммутативного кольца и цоколь модуля, связь между ними. Системы образующих модуля.**

Пусть  $\mathcal{R}$  — конечное коммутативное кольцо с  $1 \neq 0$ .

### 1°. Основные понятия теории колец.

**Определение 6.1.** Пусть  $\mathcal{R}, \mathcal{S}$  — кольца. Отображение  $f : \mathcal{R} \rightarrow \mathcal{S}$  называется *гомоморфизмом* кольца  $\mathcal{R}$  в кольцо  $\mathcal{S}$ , если оно сохраняет операции:

$$\forall a, b \in \mathcal{R}, \quad f(a + b) = f(a) + f(b), \quad f(ab) = f(a)f(b).$$

Мы будем рассматривать только унитарные гомоморфизмы колец, т.е. такие гомоморфизмы, которые отображают единицу кольца  $\mathcal{R}$  в единицу кольца  $\mathcal{S}$ . Гомоморфизм называется *изоморфизмом*, если он является биективным отображением. Кольца, между которыми имеется изоморфизм, называются *изоморфными* (обозначение  $\mathcal{R} \cong \mathcal{S}$ ). С каждым гомоморфизмом колец  $f : \mathcal{R} \rightarrow \mathcal{S}$  связаны его образ  $\text{Im}(f) = f(\mathcal{R})$  и ядро  $\ker(f) = \{x \in \mathcal{R} : f(x) = 0\}$ .

**Определение 6.2.** Подмножество  $I$  кольца  $\mathcal{R}$  называется *правым (левым) идеалом* этого кольца, если  $I$  — подмодуль правого модуля  $\mathcal{R}_{\mathcal{R}}$  (левого модуля  ${}_{\mathcal{R}}\mathcal{R}$ ). Подмножество кольца  $\mathcal{R}$ , которое является и правым и левым идеалом кольца  $\mathcal{R}$ , называется *идеалом* (иногда уточняется: двусторонним идеалом) кольца  $\mathcal{R}$ , что обозначается так:  $I \triangleleft \mathcal{R}$ . В случае коммутативного кольца все идеалы — двусторонние.

**Определение 6.3.** Пусть  $I$  — идеал кольца  $\mathcal{R}$ . Рассмотрим множество всех смежных классов  $\{x + I : x \in \mathcal{R}\}$  аддитивной группы кольца  $\mathcal{R}$  по подгруппе  $I$  и зададим на этом множестве операции

$$(x + I) + (y + I) = (x + y) + I, \quad (x + I)(y + I) = xy + I$$

для любых  $x, y \in \mathcal{R}$ . Полученное кольцо называется *фактор-кольцом* кольца  $\mathcal{R}$  по идеалу  $I$  и обозначается  $\mathcal{R}/I$ . Отображение  $\pi : \mathcal{R} \rightarrow \mathcal{R}/I$ , заданное равенством  $\pi(x) = x + I$  для любого  $x \in \mathcal{R}$ , называется *каноническим гомоморфизмом* кольца на фактор-кольцо.

**Определение 6.4.** Конечная (внешняя) *прямая сумма* колец  $\mathcal{R}_1 \oplus \dots \oplus \mathcal{R}_n$  это множество  $\mathcal{R}_1 \times \dots \times \mathcal{R}_n$  (т.е. декартово произведение множеств  $\mathcal{R}_1, \dots, \mathcal{R}_n$ ) с покоординатными операциями сложения и умножения.

**Определение 6.5.** Элемент  $e \in \mathcal{R}$  называется *идемпотентом*, если  $e^2 = e$  (заметим, что при этом  $(1 - e)^2 = 1 - 2e + e = 1 - e$  — также идемпотент).

**Лемма 6.6.** Для любого  $r \in \mathcal{R}$  существует  $k = k(r) \in \mathbb{N}$ , для которого  $r^k$  — идемпотент.

◀ Выберем  $m, n \in \mathbb{N}$ , для которых  $r^{m+n} = r^n$ . Умножая на  $r^m$  и  $r^n$  несколько раз, имеем  $r^{pn+qm} = r^{pn}$  для любых  $p, q \in \mathbb{N}$ . Осталось взять  $p = m, q = n$  и  $k = mn$ . ▶

**Определение 6.7.** *Полное ортогональное множество идемпотентов* (сокращённо, *ПОМИ*) — это такая система элементов  $e_1, \dots, e_n \in \mathcal{R} \setminus \{0\}$ , что

1)  $e_i e_j = \delta_{ij} e_i$ ,  $1 \leq i, j \leq n$ , в частности,  $e_i^2 = e_i$ ,  $i = 1, \dots, n$ ;

2)  $\sum_{i=1}^n e_i = 1$ .

**Теорема 6.8.**  $\mathcal{R} \cong \mathcal{R}_1 \oplus \dots \oplus \mathcal{R}_n$  тогда и только тогда, когда существует ПОМИ  $e_1, \dots, e_n \in \mathcal{R}$  такое, что  $\mathcal{R}_i \cong \mathcal{R} e_i$ ,  $i = 1, \dots, n$ .

◀ “ $\Rightarrow$ ” Положим  $e_i = (0, \dots, 0, 1_{\mathcal{R}_i}, 0, \dots, 0)$ . По определению операций в прямой сумме колец множество  $e_1, \dots, e_n$  является ПОМИ и  $\mathcal{R} e_i \cong \mathcal{R}_i$ .

“ $\Leftarrow$ ” Пусть  $e_1, \dots, e_n \in \mathcal{R}$  — ПОМИ. Зададим отображение  $\varphi : \mathcal{R} \rightarrow \mathcal{R}_1 \oplus \dots \oplus \mathcal{R}_n$  так, что  $\varphi(r) = (re_1, \dots, re_n)$ .

Проверим, что  $\varphi$  — гомоморфизм колец. Действительно, для произвольных  $r, s \in \mathcal{R}$  имеем

$$\varphi(r) = (re_1, \dots, re_n), \quad \varphi(s) = (se_1, \dots, se_n).$$

Откуда сразу получаем, что

$$\begin{aligned} \varphi(r + s) &= ((r + s)e_1, \dots, (r + s)e_n) = \\ &= (re_1, \dots, re_n) + (se_1, \dots, se_n) = \varphi(r) + \varphi(s). \end{aligned}$$

Кроме того

$$rse_j = rse_j^2 = re_j se_j \quad \forall j = 1, \dots, n,$$

поэтому

$$\varphi(rs) = (rse_1, \dots, rse_n) = (re_1se_1, \dots, re_nse_n) = \varphi(r)\varphi(s).$$

Проверим, что  $\varphi$  — биекция. Условие, что  $r \in \ker(\varphi)$  означает, что  $(re_1, \dots, re_n) = (0, \dots, 0)$ , т.е.  $re_i = 0$  для всех  $i = 1, \dots, n$ . Следовательно,  $r = r \cdot 1 = \sum_{i=1}^n re_i = 0$ , значит,  $\ker(\varphi) = \{0\}$ . Инъективность отображения  $\varphi$  доказана. Для  $r = r_1e_1 + \dots + r_n e_n$  имеем  $re_i = r_i e_i$  по ортогональности, поэтому  $\varphi(r) = (re_1, \dots, re_n) = (r_1e_1, \dots, r_n e_n)$  — произвольный элемент кольца  $\mathcal{R}_1 \oplus \dots \oplus \mathcal{R}_n$ , т.е.  $\varphi$  — сюръективно. ►

**Определение 6.9.** Элемент  $r \in \mathcal{R}$  называется *нильпотентным*, если существует  $n \in \mathbb{N}$ , что  $r^n = 0$ .

**Определение 6.10.** Определим произведение идеала  $I$  кольца  $\mathcal{R}$  на правый  $\mathcal{R}$ -модуль  $M$ :

$$MI = \left\{ \sum_{i=1}^n x_i a_i : n \in \mathbb{N}, x_i \in M, a_i \in I \right\}.$$

В частности, таким образом определены степени идеала:  $I, I^2, \dots$

**Определение 6.11.** Идеал  $I \triangleleft \mathcal{R}$  называется *нильпотентным*, если  $I^n = 0$  для некоторого  $n \in \mathbb{N}$ .

**Определение 6.12.** *Радикал*  $J(\mathcal{R})$  конечногo коммутативного кольца  $\mathcal{R}$  — множество всех его нильпотентных элементов.

**Лемма 6.13.**  $J(\mathcal{R})$  — нильпотентный идеал в  $\mathcal{R}$ .

◀  $J(\mathcal{R})$  — идеал в  $\mathcal{R}$ , поскольку если  $r^n = 0, s^k = 0$ , то

$$\begin{aligned} (r + s)^{n+k} &= \\ &= \sum_{i=0}^{n+k} C_{n+k}^i r^i s^{n+k-i} = \sum_{i=0}^n C_{n+k}^i r^i s^{n-i} s^k + \sum_{i=n+1}^{n+k} C_{n+k}^i r^n r^{i-n} s^{n+k-i} = \\ &= 0 + 0 = 0, \end{aligned}$$

и для любого  $u \in \mathcal{R}$ :  $(ur)^n = u^n r^n = u^n 0 = 0$ , т.е.  $r + s, ur \in J(\mathcal{R})$ .

В силу конечности  $\mathcal{R}$  множество  $J(\mathcal{R})$  тоже конечно. Поэтому существует  $t \in \mathbb{N}$ , что  $a^t = 0$  для всех  $a \in J(\mathcal{R})$  (берём максимум

таких степеней по всем элементам радикала). Пусть  $m = |J(\mathcal{R})|$ . Тогда по принципу Дирихле в произведении любых  $N = m(t-1) + 1$  элементов  $x_1, \dots, x_N \in J(\mathcal{R})$  хотя бы один элемент  $x_s$  повторяется по крайней мере  $t$  раз, что в силу коммутативности кольца означает, что произведение  $x_1 \cdots x_N = (x_s)^t \cdot a = 0a = 0$ , где  $a$  — произведение оставшихся элементов. Откуда  $J(\mathcal{R})^N = 0$ . ►

## 2°. Локальные кольца, эквивалентные определения.

**Определение 6.14.** Кольцо  $\mathcal{R}$  называется *локальным*, если фактор-кольцо  $\mathcal{R}/J(\mathcal{R})$  — поле.

Следующая теорема даёт четыре эквивалентных определения локального кольца.

**Теорема 6.15.** Следующие утверждения эквивалентны:

- 1)  $\mathcal{R}$  — локальное кольцо;
- 2) в  $\mathcal{R}$  ровно два идемпотента (0 и 1);
- 3)  $\forall a \in \mathcal{R}$  один из элементов  $a$  либо  $1 - a$  обратим;
- 4)  $\mathcal{R} = \mathcal{R}^* \cup J(\mathcal{R})$ , где  $\mathcal{R}^*$  — группа обратимых элементов кольца  $\mathcal{R}$ .

◀ “1)  $\Rightarrow$  2)” Допустим, что в  $\mathcal{R}$  есть идемпотент  $e$ , отличный от 0 и 1. Тогда  $1 - e \neq 0$ ,  $1 - e$  — тоже нетривиальный идемпотент. По определению  $e, 1 - e \notin J(\mathcal{R})$ . В фактор-кольце  $\mathcal{R}/J(\mathcal{R})$ :  $e + J(\mathcal{R}), 1 - e + J(\mathcal{R})$  — ненулевые элементы, но  $(e + J(\mathcal{R}))(1 - e + J(\mathcal{R})) = 0 + J(\mathcal{R})$ . В поле  $\mathcal{R}/J(\mathcal{R})$  нет делителей нуля, поэтому  $e$  или  $1 - e$  лежит в  $J(\mathcal{R})$ . Противоречие.

“2)  $\Rightarrow$  4)” Для произвольного  $a \in \mathcal{R}$  по лемме 6.6 существует  $k \in \mathbb{N}$ , что  $a^k$  — идемпотент. По условию 2) возможны 2 случая:  $a^k = 1$ , либо  $a^k = 0$ . Если  $a^k = 0$ , то по определению  $a \in J(\mathcal{R})$ . Если  $a^k = 1$ , то  $a \cdot a^{k-1} = 1$ , т.е.  $a^{k-1} = a^{-1}$  и  $a \in \mathcal{R}^*$ . Откуда  $\mathcal{R} = \mathcal{R}^* \cup J(\mathcal{R})$ .

“4)  $\Rightarrow$  3)” Для произвольного  $a \in \mathcal{R}$ , либо  $a$  сам обратим, либо  $a \in J(\mathcal{R})$ . Во втором случае  $a^n = 0$  и  $(1 - a)(1 + a + \dots + a^{n-1}) = 1 - a^n = 1$ ,  $(1 - a)^{-1} = 1 + a + \dots + a^{n-1}$ , поэтому  $1 - a$  — обратимый элемент.

“3)  $\Rightarrow$  1)” Для произвольного  $a \in \mathcal{R}$  один из элементов  $a$  либо  $1 - a$  обратим. Пусть  $a \notin J(\mathcal{R})$ . Тогда для некоторого  $k \in \mathbb{N}$   $a^k = e$  — идемпотент. Единственный идемпотент в  $J(\mathcal{R})$  — это 0, поскольку для идемпотента  $e$  и любого  $k \in \mathbb{N}$ :  $e^k = e$ , с другой стороны для  $e \in J(\mathcal{R})$  существует  $m \in \mathbb{N}$   $e^m = 0$ , откуда  $0 = e^m = e$ . По условию  $a^k \neq 0$ , поэтому  $e \notin J(\mathcal{R})$ . Заметим, что если  $e \neq 1$ , то  $e(1 - e) = 0$  и

$e$  и  $1 - e$  — ненулевые делители нуля, следовательно, не могут быть обратимы. Противоречие с условием 3), значит,  $e = 1$ . Поэтому элемент  $a + J(\mathcal{R})$  — обратим в фактор-кольце, т.е. в этом кольце любой ненулевой обратим и оно является полем. ►

### 3°. Разложение конечного коммутативного кольца в прямую сумму локальных колец.

**Теорема 6.16.** Любое конечное коммутативное кольцо  $\mathcal{R}$  с  $1 \neq 0$  раскладывается в прямую сумму  $\mathcal{R} = \mathcal{R}_1 \oplus \dots \oplus \mathcal{R}_n$ , где все  $\mathcal{R}_i$  — локальные кольца.

◄ В  $\mathcal{R}$  есть ПОМИ (например, из одного элемента 1). Возьмём среди них самую большую по числу элементов (такая существует в силу конечности  $\mathcal{R}$ ) ПОМИ  $e_1, \dots, e_n$ .  $\mathcal{R} = \mathcal{R}_1 \oplus \dots \oplus \mathcal{R}_n$  для  $\mathcal{R}_i = \mathcal{R}e_i$ .

Докажем, что для каждого  $i = 1, \dots, n$  кольцо  $\mathcal{R}e_i$  локально. Допустим существует  $e \in \mathcal{R}e_i$  — идемпотент и  $e \neq 0, e_i$ . Рассмотрим систему  $e_1, \dots, e_{i-1}, e, e_i - e, e_{i+1}, \dots, e_n$ . Имеем  $e + (e_i - e) = e_i$ , поэтому  $e_1 + \dots + e_{i-1} + e + e_i - e + e_{i+1} + \dots + e_n = \sum_{j=1}^n e_j = 1$ .

Также из условия  $e \in \mathcal{R}e_i$  имеем  $e = e_i e = e e_i$ . Откуда  $e(e_i - e) = 0$ ,  $e e_j = e e_i e_j = 0$ ,  $(e_i - e)e_j = 0 - 0 = 0$  для всех  $j \neq i$ . Получили бóльшую по числу элементов ПОМИ, противоречие. Таким образом, в кольце  $\mathcal{R}e_i$  ровно два идемпотента и оно является локальным по условию (2) теоремы 6.15. ►

**Определение 6.17.** Идемпотент  $e \in \mathcal{R}$  называется *локальным идемпотентом*, если кольцо  $\mathcal{R}e$  локально.

**Следствие 6.18.** Для произвольного конечного коммутативного кольца  $\mathcal{R}$  с  $1 \neq 0$  имеем  $\mathcal{R}/J(\mathcal{R}) = \mathbb{F}_1 \oplus \dots \oplus \mathbb{F}_n$ , где все  $\mathbb{F}_i$  — конечные поля.

◄  $\mathcal{R}/J(\mathcal{R}) = \bigoplus_{i=1}^n (\mathcal{R}/J(\mathcal{R}))e_i$  по теореме 6.16.  $(\mathcal{R}/J(\mathcal{R}))e_i$  — локальное кольцо с нулевым радикалом, поэтому оно само является полем. ►

#### 4°. Модули.

Пусть  $\mathcal{R}$  — конечное коммутативное кольцо с  $1 \neq 0$ .

**Определение 6.19.** Внешняя *прямая сумма*  $M_1 \oplus \dots \oplus M_n$   $\mathcal{R}$ -модулей  $M_1, \dots, M_n$  — множество всех строк  $(m_1, \dots, m_n)$ , где  $m_i \in M_i \forall i \in \{1, \dots, n\}$ , с покомпонентными сложением и умножением на элементы кольца  $\mathcal{R}$ .

**Предложение 6.20.** Пусть  $M_1, \dots, M_n$  — подмодули модуля  $M$ . Тогда следующие условия эквивалентны:

- 1) Если  $x_1 + \dots + x_n = 0$ , где  $x_i \in M_i, i = 1, \dots, n$ , то  $x_1 = \dots = x_n = 0$ .
- 2) Для любого  $i \in \{1, \dots, n\}$ :

$$M_i \cap (M_1 + \dots + M_{i-1} + M_{i+1} + \dots + M_n) = 0.$$

**Определение 6.21.** Если для семейства подмодулей  $M_1, \dots, M_n$  модуля  $M$  выполнены условия предложения 6.20, то говорят, что это семейство образует *прямую сумму подмодулей*. В этом случае сумма данного семейства обозначается как прямая сумма:  $M_1 \oplus \dots \oplus M_n$ . Подмодуль  $N$  модуля  $M$  называется *прямым слагаемым*, если существует подмодуль  $K$  модуля  $M$ , такой, что  $M = N \oplus K$ .

**Определение 6.22.** Пусть  $N$  — подмодуль правого  $\mathcal{R}$ -модуля  $M$ . Рассмотрим множество всех смежных классов  $\{x + N : x \in M\}$  аддитивной группы модуля  $M$  по подгруппе  $N$  и зададим на этом множестве операции  $(x + N) + (y + N) = (x + y) + N$ ,  $(x + N)r = xr + N$  для любых  $x, y \in M$  и  $r \in \mathcal{R}$ . Множество смежных классов, снабжённое этими операциями, оказывается правым  $\mathcal{R}$ -модулем. Этот модуль называется *фактор-модулем* модуля  $M$  по подмодулю  $N$  и обозначается  $M/N$ . Отображение  $\pi : M \rightarrow M/N$ , заданное равенством  $\pi(x) = x + N$  для любого  $x \in M$ , называется *каноническим гомоморфизмом* модуля на фактор-модуль.

**Определение 6.23.** Модуль  $V$  называется *простым*, или *неприводимым*, если он содержит ровно два подмодуля ( $0$  и  $V$ ).

**Определение 6.24.** *Цоколем* модуля  $M$  называется сумма всех неприводимых подмодулей модуля  $M$  (обозначение  $\text{soc}M$ ). Если  $M$  не имеет простых подмодулей, то считаем  $\text{soc}M = 0$ .

**Определение 6.25.** Модуль  $M$  называется *вполне приводимым*, если каждый подмодуль модуля  $M$  выделяется прямым слагаемым.

**Лемма 6.26** (Лемма Накаямы). Пусть  $M$  — правый  $\mathcal{R}$ -модуль. Если  $MJ(\mathcal{R}) = M$ , то  $M = 0$ .

◀ Пусть  $MJ(\mathcal{R}) = M$ . В этом случае  $MJ(\mathcal{R})^2 = MJ(\mathcal{R}) = M$ , и по индукции,  $MJ(\mathcal{R})^n = M$  для всех  $n \in \mathbb{N}$ . Но по лемме 6.13 существует  $n \in \mathbb{N}$ , что  $J(\mathcal{R})^n = 0$ . Тогда  $M = MJ(\mathcal{R})^n = 0$ . ▶

**Лемма 6.27** (Лемма Накаямы, эквивалентная формулировка). Пусть  $M$  — правый  $\mathcal{R}$ -модуль,  $N \leq M$ . Если  $N + MJ(\mathcal{R}) = M$ , то  $N = M$ .

◀ “ $\Rightarrow$ ” Переходим к  $M/N$ . Имеем  $M/N \cdot J(\mathcal{R}) = M/N$ , тогда по лемме 6.26 выполнено  $M/N = 0$ , значит,  $M = N$ .

“ $\Leftarrow$ ” Утверждение выполнено для всех модулей  $N$ . Возьмём  $N = 0$ . ▶

**Предложение 6.28.** Пусть  $M \neq 0$  — конечный модуль. Тогда существуют неприводимые подмодули  $V_1, \dots, V_n \leq M$  такие, что

$$\text{soc}M = V_1 \oplus \dots \oplus V_n.$$

◀ В силу конечности существует ненулевой подмодуль  $V \leq M$  с минимальным числом элементов. Условие минимальности в частности означает, что  $V$  — неприводимый модуль. Положим  $V_1 = V$ . Если  $V = \text{soc}M$ , то всё готово,  $\text{soc}M = V_1$  — прямая сумма из одного слагаемого.

Иначе существует неприводимый модуль  $V_2 \not\subseteq V = V_1$ . Тогда  $V_1 \cap V_2 \leq V_2$  и  $V_1 \cap V_2 \neq V_2$ , т.к.  $V_2 \not\subseteq V_1$ , значит,  $V_1 \cap V_2 = 0$ . Тогда  $V_1 \oplus V_2 \leq \text{soc}M$ .

Аналогично предыдущему шагу имеем два варианта: либо  $V_1 \oplus V_2 = \text{soc}M$  и всё готово, либо существует неприводимый модуль  $V_3 \not\subseteq V_1 \oplus V_2$ . Во втором случае снова получаем прямую сумму  $V_1 \oplus V_2 \oplus V_3$  и т.д. В силу конечности модуля  $M$  число шагов в этом процессе конечно, поэтому существует  $n \in \mathbb{N}$ , что  $\text{soc}M = V_1 \oplus \dots \oplus V_n$ . ▶

Пусть  $M$  — правый  $\mathcal{R}$ -модуль.

**Определение 6.29.** Для  $S \subseteq M$ ,  $T \subseteq \mathcal{R}$  определим *аннуляторы*

$$\text{ann}_{\mathcal{R}}(S) = \{r \in \mathcal{R} : Sr = 0\},$$

$$\text{ann}_M(T) = \{m \in M : mT = 0\}.$$

По определению  $\text{ann}_{\mathcal{R}}(S) \triangleleft \mathcal{R}$ ,  $\text{ann}_M(T) \leq M$ .

Отметим ещё некоторые свойства аннуляторов:

**Предложение 6.30.** Пусть  $M$  — правый  $\mathcal{R}$ -модуль,  $S \subseteq M$ ,  $T \subseteq \mathcal{R}$ . Тогда

- 1)  $S \subseteq \text{ann}_M(\text{ann}_{\mathcal{R}}(S))$ ,  $T \subseteq \text{ann}_{\mathcal{R}}(\text{ann}_M(T))$ ;
- 2) если  $N_1, N_2 \leq M$  и  $N_1 \subseteq N_2$ , то  $\text{ann}_{\mathcal{R}}(N_1) \supseteq \text{ann}_{\mathcal{R}}(N_2)$ , если  $I_1, I_2 \triangleleft \mathcal{R}$  и  $I_1 \subseteq I_2$ , то  $\text{ann}_M(I_1) \supseteq \text{ann}_M(I_2)$ ;
- 3) для  $N \leq M$  и  $I \triangleleft \mathcal{R}$  выполнены равенства:

$$\text{ann}_{\mathcal{R}}(\text{ann}_M(\text{ann}_{\mathcal{R}}(N))) = \text{ann}_{\mathcal{R}}(N),$$

$$\text{ann}_M(\text{ann}_{\mathcal{R}}(\text{ann}_M(I))) = \text{ann}_M(I).$$

◀ 1) Пусть  $s \in S$ . Тогда  $s \cdot \text{ann}_{\mathcal{R}}(S) = 0$ , следовательно,  $s \in \text{ann}_M(\text{ann}_{\mathcal{R}}(S))$ . Аналогично,  $T \subseteq \text{ann}_{\mathcal{R}}(\text{ann}_M(T))$ .

2) очевидно.

3) К  $\text{ann}_M(\text{ann}_{\mathcal{R}}(N)) \supseteq N$  применяем утверждение пункта 2):  $\text{ann}_{\mathcal{R}}(\text{ann}_M(\text{ann}_{\mathcal{R}}(N))) \subseteq \text{ann}_{\mathcal{R}}(N)$ . Обратное включение получается применением утверждения пункта 1) к  $T = \text{ann}_{\mathcal{R}}(N)$ . Аналогично, применяя пункты 1) и 2), получаем, что  $\text{ann}_M(\text{ann}_{\mathcal{R}}(\text{ann}_M(I))) = \text{ann}_M(I)$ . ▶

**Теорема 6.31.** Пусть  $M$  — правый  $\mathcal{R}$ -модуль,  $J(\mathcal{R})$  — радикал кольца  $\mathcal{R}$ . Тогда  $\text{soc}M = \text{ann}_M(J(\mathcal{R}))$ .

◀ Пусть  $V \neq 0$  — неприводимый подмодуль модуля  $M$ . Докажем, что  $V \subseteq \text{ann}_M(J(\mathcal{R}))$ . Имеем  $VJ(\mathcal{R}) \leq V$ . Если  $VJ(\mathcal{R}) = 0$ , то требуемое включение выполнено. Иначе,  $VJ(\mathcal{R}) = V$ . Тогда по лемме Накаямы (6.26)  $V = 0$ , противоречие. Таким образом,  $\text{soc}M \subseteq \text{ann}_M(J(\mathcal{R}))$ .

Обратно, пусть  $N = \text{ann}_M(J(\mathcal{R}))$ .  $N$  превращается в модуль над кольцом  $\mathcal{R}/J(\mathcal{R})$ , если для  $x \in N$  естественным образом положить  $x(r + J(\mathcal{R})) = xr$ . Согласно следствию 6.18, имеем  $\bar{\mathcal{R}} = \mathcal{R}/J(\mathcal{R}) = \mathbb{F}_1 \oplus \dots \oplus \mathbb{F}_n$ , где все  $\mathbb{F}_i$  — конечные поля,  $\mathbb{F}_i \cong \bar{\mathcal{R}}e_i$ ,  $e_1 + \dots + e_n = \bar{1}$ ,  $e_i e_j = \bar{0}$ ,  $\forall i \neq j$ . Тогда  $N = Ne_1 \oplus \dots \oplus Ne_n$ . Каждый модуль  $Ne_i$  является  $\bar{\mathcal{R}}e_i$ -модулем. Модуль над полем — это линейное пространство. Оно раскладывается в прямую сумму одномерных пространств (неприводимых модулей). Тогда  $Ne_i$  как сумма неприводимых модулей содержится в  $\text{soc}M$ . Это верно для любого  $i = 1, \dots, n$ . Откуда,  $N \subseteq \text{soc}M$ . ▶

**Определение 6.32.** Пусть  $S$  — произвольное множество элементов правого модуля  $M$  над кольцом  $\mathcal{R}$ . Наименьший (по включению) подмодуль  $\langle S \rangle_{\mathcal{R}}$  модуля  $M$ , содержащий множество  $S$ , называется

подмодулем, порождённым множеством  $S$ . Аналогично определяется идеал  $(T)_{\mathcal{R}}$ , порождённый подмножеством  $T$  кольца  $\mathcal{R}$ . Если  $N = \langle S \rangle_{\mathcal{R}}$ , говорят также, что  $S$  — система образующих подмодуля  $N$ . Аналогично, если  $I = (T)_{\mathcal{R}}$ , то говорят, что  $T$  — система образующих идеала  $I$ .

**Предложение 6.33.** Пусть  $S$  — произвольное множество элементов правого модуля  $M$  над кольцом  $\mathcal{R}$ . Тогда

$$\langle S \rangle_{\mathcal{R}} = \mathcal{S}\mathcal{R} = \{x_1r_1 + \dots + x_nr_n : x_i \in S, r_i \in \mathcal{R}, i = 1, \dots, n, n \geq 0\}.$$

**Определение 6.34.** Модуль, имеющий систему образующих из одного элемента, называется *циклическим* модулем. Идеал, имеющий систему образующих из одного элемента, называется *главным* идеалом. Модуль (идеал), имеющий конечную систему образующих, называется *конечно порождённым*. Для конечно порождённого модуля  $M$  через  $\rho(M)$  обозначим минимальную мощность его системы образующих.

Из предложения 6.33 очевидно, что  $|M| \leq |\mathcal{R}|^t$ , где  $t = \rho(M)$ .

**Определение 6.35.**  $M$  — свободный  $\mathcal{R}$ -модуль ранга  $t$ , если у него существует линейно независимая над  $\mathcal{R}$  система из  $t$  образующих.

Из определений очевидно следует

**Предложение 6.36.**  $M$  — свободный  $\mathcal{R}$ -модуль ранга  $t$  тогда и только тогда, когда  $\rho(M) = t$  и  $|M| = |\mathcal{R}|^t$ .

По теореме 6.16 имеем  $\mathcal{R} = \mathcal{R}_1 \oplus \dots \oplus \mathcal{R}_n$ , где все  $\mathcal{R}_i$  — локальные кольца,  $\mathcal{R}_i \cong \mathcal{R}e_i$ . Тогда  $M_{\mathcal{R}} = M_1 \oplus \dots \oplus M_n$ , где  $M_s = Me_s$ ,  $s = 1, \dots, n$ . Каждый модуль  $M_s$  является  $\mathcal{R}_s$ -модулем, поскольку  $\mathcal{R}_s = \mathcal{R}e_s = e_s\mathcal{R}$ .

**Предложение 6.37.**  $\rho(M_{\mathcal{R}}) = \max\{\rho((M_s)_{\mathcal{R}_s}) : s \in \{1, \dots, n\}\}$ .

◀ Пусть  $m_1, \dots, m_r$  — система образующих модуля  $M$ . Тогда  $m_1e_s, \dots, m_re_s$  — образующие для  $(M_s)_{\mathcal{R}_s}$ . Потому  $\rho(M) \geq \rho(M_s)$ . Обратно, пусть  $m_1^{(s)}, \dots, m_{r_s}^{(s)}$  — образующие  $(M_s)_{\mathcal{R}_s}$ ,  $s = 1, \dots, n$ . Положим  $r = \max\{r_1, \dots, r_n\}$  и дополним при необходимости все системы образующих нулями, чтобы считать, что  $r = r_1 = \dots = r_n$ . Тогда в  $M$  можно взять образующие  $m_1 = m_1^{(1)} + \dots + m_1^{(n)}, \dots, m_r = m_r^{(1)} + \dots + m_r^{(n)}$ . ▶

Обозначим  $\widetilde{M} = M/MJ(\mathcal{R})$ . Для  $m \in M$  полагаем  $\widetilde{m} = m + MJ(\mathcal{R}) \in \widetilde{M}$ . По лемме Накаямы (6.26) если  $M \neq 0$ , то  $\widetilde{M} \neq 0$ . Если  $\mathcal{R}$  — локальное кольцо, то фактор-кольцо  $\overline{\mathcal{R}} = \mathcal{R}/J(\mathcal{R})$  — поле. Модуль  $\widetilde{M}_{\mathcal{R}}$  превращается в пространство над  $\overline{\mathcal{R}}$ :

$$\forall \widetilde{m} \in \widetilde{M}, \bar{\alpha} = \alpha + J(\mathcal{R}) \in \overline{\mathcal{R}} : \bar{\alpha}\widetilde{m} = \widetilde{m}\bar{\alpha}.$$

При этом подмодули модуля  $\widetilde{M}_{\mathcal{R}}$  и подпространства пространства  $\overline{\mathcal{R}}\widetilde{M}$  соответствуют друг другу.

**Предложение 6.38.** Если  $\mathcal{R}$  — локальное кольцо, то  $\rho(M_{\mathcal{R}}) = \dim_{\overline{\mathcal{R}}}\widetilde{M}$ , и для любых  $m_1, \dots, m_t \in M$  равенства

$$M = \langle m_1, \dots, m_t \rangle_{\mathcal{R}} \tag{6.1}$$

и

$$\widetilde{M} = \overline{\mathcal{R}}\langle \widetilde{m}_1, \dots, \widetilde{m}_t \rangle \tag{6.2}$$

эквивалентны.

◀ Равенство (6.2) равносильно условию  $M = \langle m_1, \dots, m_t \rangle_{\mathcal{R}} + J(\mathcal{R})M$ . По лемме Накаямы 6.26 последнее равенство эквивалентно равенству (6.1). ▶

**Предложение 6.39.** Для модуля  $M_{\mathcal{R}}$  над локальным кольцом  $\mathcal{R}$  эквивалентны следующие утверждения:

- 1)  $M_{\mathcal{R}}$  — неприводимый модуль;
- 2)  $MJ(\mathcal{R}) = 0$  и  $\dim_{\overline{\mathcal{R}}}\widetilde{M} = 1$ ;
- 3)  $M_{\mathcal{R}} \cong \overline{\mathcal{R}}_{\mathcal{R}}$ ;
- 4)  $|M| = |\overline{\mathcal{R}}|$ .

◀ “1)  $\Rightarrow$  2)” Поскольку  $M_{\mathcal{R}}$  — неприводимый модуль, то  $M \neq 0$ . Рассмотрим подмодуль  $MJ(\mathcal{R})$  модуля  $M$ . По лемме Накаямы (6.26)  $M \neq MJ(\mathcal{R})$ . Но тогда из неприводимости  $M$  следует, что  $MJ(\mathcal{R}) = 0$ . В силу соответствия подмодулей модуля  $\widetilde{M}_{\mathcal{R}}$  и подпространств пространства  $\overline{\mathcal{R}}\widetilde{M}$ , пространство  $\overline{\mathcal{R}}\widetilde{M}$  не имеет нетривиальных подпространств, что возможно, только если  $\dim_{\overline{\mathcal{R}}}\widetilde{M} = 1$ .

Импликация “2)  $\Rightarrow$  3)” следует из предложения 6.38.

“3)  $\Rightarrow$  4)” Очевидно.

“4)  $\Rightarrow$  1)” Пусть  $N \leq M$ . Из предложения 6.38 следует, что если  $N \neq 0$ , то  $|N| \geq |\overline{\mathcal{R}}| = q$ . Значит,  $|N| = |M|$ , т.е.  $N = M$ , следовательно, модуль  $M$  является неприводимым. ▶

## Задачи к лекции 6.

**Задача 1.** Определите, сколько идемпотентов в кольце вычетов  $\mathbb{Z}_n$ . Опишите их. Для каких  $n$  кольцо  $\mathbb{Z}_n$  является локальным?

**Задача 2.** Найдите радикал  $J(\mathbb{Z}_n)$ .

**Задача 3.** Верно ли, что подкольцо локального конечного коммутативного кольца с единицей тоже локально?

**Задача 4.** Приведите пример, показывающий что в определении цоколя сумма подмодулей не обязана быть прямой.

**Задача 5.** Для каких модулей выполнено  $M = \text{soc}M$ ?

**Задача 6.** Пусть  $N$  — подмодуль конечного модуля  $M$ . Покажите, что  $\text{soc}(N) = N \cap \text{soc}(M)$ .

**Задача 7.** Покажите, что  $\text{soc}(\text{soc}M) = \text{soc}M$  для произвольного  $R$ -модуля  $M$ .

**Задача 8.** Верно ли, что цоколь циклического модуля является циклическим?

**Задача 9.** Пусть модуль  $M$  раскладывается в сумму подмодулей  $M = M_1 + M_2$ . Верно ли, что  $\text{soc}M = \text{soc}M_1 + \text{soc}M_2$ ?

**Лекция 7. Модуль характеров конечного модуля. Инъективные модули. Критерий Бэра. Инъективность модуля характеров. Квазифробениусов модуль, существование и единственность с точностью до изоморфизма.**

**1°. Модуль характеров.**

**Определение 7.1.** *Группой характеров* модуля  $M$  назовём абелеву группу  $M^* = \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(M, \mathbb{Q}/\mathbb{Z})$ .

**Предложение 7.2.** 1) Имеет место изоморфизм групп  $(M^*, +) \cong (M, +)$ .

2)  $\forall b \in M \setminus \{0\} \exists \chi \in M^* : \chi(b) \neq 0$ .

◀ 1. Разложим абелеву группу  $M$  в прямую сумму примарных циклических подгрупп:  $M = \langle a_1 \rangle_{n_1} \oplus \dots \oplus \langle a_t \rangle_{n_t}$ . Рассмотрим характер  $\chi_i$  модуля  $M$  такой, что  $\chi_i(a_j) = \delta_{ij} \frac{1}{n_i}$ , здесь  $\delta_{ij}$  — символ Кронекера,  $i \in \{1, \dots, t\}$ . Тогда  $n_i \chi_i \equiv 0$ ,  $m \chi_i(a_i) = \frac{m}{n_i} \neq 0$ ,  $1 \leq m < n_i$ , поэтому  $\text{ord}(\chi_i) = n_i = \text{ord}(a_i)$ . Поскольку любой характер  $\chi \in \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(M, \mathbb{Q}/\mathbb{Z})$  задаётся образами порождающих элементов  $a_i$ ,  $i \in \{1, \dots, t\}$ , то  $M^* \cong \langle \chi_1 \rangle_{n_1} \oplus \dots \oplus \langle \chi_t \rangle_{n_t} \cong M$ .

2. Если  $b \in M \setminus \{0\}$ , то в разложении  $b = b_1 + \dots + b_t$ ,  $b_i \in \langle a_i \rangle_{n_i}$ , хотя бы один элемент  $b_i$  отличен от нуля,  $i \in \{1, \dots, t\}$ . В этом случае  $b_i = m a_i$ , где  $1 \leq m < n_i$ . Тогда в качестве искомого характера  $\chi$  можно выбрать  $\chi_i$ . Действительно,  $\chi_i(b) = \chi_i(b_i) = \frac{m}{n_i} \neq 0$ . ▶

**Определение 7.3.** Если  $M$  — левый  $\mathcal{R}$ -модуль, то определим произведение произвольного характера  $\chi \in \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(M, \mathbb{Q}/\mathbb{Z})$  на элемент  $r$  кольца  $\mathcal{R}$  справа как характер  $\chi r$ , заданный формулой

$$\forall x \in M, \quad (\chi r)(x) = \chi(rx). \quad (7.1)$$

Легко проверить, что получается структура правого  $\mathcal{R}$ -модуля на группе  $\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(M, \mathbb{Q}/\mathbb{Z})$  (заметим, что если  $\chi \in \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(M, \mathbb{Q}/\mathbb{Z})$ ,  $r, s \in \mathcal{R}$  и  $x \in M$ , то  $((\chi r)s)(x) = (\chi r)(sx) = \chi(rsx) = (\chi(rs))(x)$ ). Полученный модуль будем называть *модулем характеров* модуля  $M$  и обозначим через  $M^*$ .

Аналогично, если  $M$  — правый  $\mathcal{R}$ -модуль, то на группе его характеров вводится умножение слева на элементы кольца  $\mathcal{R}$  формулой

$$\forall x \in M, \quad (r\chi)(x) = \chi(xr), \quad (7.2)$$

которое определяет структуру левого  $\mathcal{R}$ -модуля на группе  $\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(M, \mathbb{Q}/\mathbb{Z})$  (заметим, что  $(r(s\chi))(x) = (s\chi)(xr) = \chi(xrs) = ((rs)\chi)(x)$ ).

Этот модуль мы также будем называть *модулем характеров* и обозначать через  $M^*$ .

Предложение 7.2 не обобщается в общем случае до утверждения об изоморфизме модулей  $M$  и  $M^*$ , однако справедлива

**Теорема 7.4.** Для любого модуля  $M$  существует канонический изоморфизм  $\mathcal{R}$ -модулей  $\mathcal{R}M \cong \mathcal{R}M^{**}$ .

◀ Для любого  $m \in M$  определим гомоморфизм абелевых групп  $\varphi_m : M^* \rightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$  формулой  $\varphi_m(\chi) = \chi(m)$ . Заметим, что отображение  $m \mapsto \varphi_m$  — гомоморфизм левых  $\mathcal{R}$ -модулей. Действительно, для любого  $r \in \mathcal{R}$  имеем

$$\varphi_{(rm)}(\chi) = \chi(rm) \stackrel{(7.1)}{=} (\chi r)(m) = \varphi_m(\chi r) = (r\varphi_m)(\chi).$$

Если  $m \neq 0$ , то согласно пункту 2 предложения 7.2 существует характер  $\chi \in M^*$  такой, что  $\chi(m) \neq 0$ . Следовательно,  $\varphi_m \in M^{**} \setminus \{0\}$  и гомоморфизм  $m \mapsto \varphi_m$  — мономорфизм.

В силу пункта 1 предложения 7.2 также имеем  $|M| = |M^*| = |M^{**}|$ . Следовательно, мономорфизм  $m \mapsto \varphi_m$  есть изоморфизм. ▶ Для правого модуля  $M$  верно аналогичное утверждение.

**Предложение 7.5.** Если  $M = M_1 \oplus M_2$  — прямая сумма модулей, то существует канонический изоморфизм  $\mathcal{R}$ -модулей  $M^* \cong M_1^* \oplus M_2^*$ .

◀ Произвольному элементу  $\vec{\chi} = (\chi_1, \chi_2) \in M_1^* \oplus M_2^*$  сопоставим отображение  $\chi_m : M \rightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ , определённое на элементе  $\vec{m} = (m_1, m_2) \in M_1 \oplus M_2$  правилом  $\chi_m(\vec{m}) = \chi_1(m_1) + \chi_2(m_2)$ . По построению очевидно, что  $\chi_m$  есть характер группы  $(M, +)$ , и различным элементам из  $M_1^* \oplus M_2^*$  соответствуют разные характеры. Поскольку в силу пункта 1 предложения 7.2  $|M_1^* \oplus M_2^*| = |M| = |M^*|$ , то имеет место изоморфизм групп  $M^* \cong M_1^* \oplus M_2^*$ . Осталось доказать, что имеет место гомоморфизм модулей. Действительно, для любого  $r \in \mathcal{R}$  имеем

$$(\vec{\chi}r)(\vec{m}) \stackrel{(7.1)}{=} \chi_m(r\vec{m}) = \chi_1(rm_1) + \chi_2(rm_2) = (\chi_1r, \chi_2r)(\vec{m}).$$



**2°. Инъективные модули. Критерий Бэра. Инъективность модуля характеров.**

**Определение 7.6.** Левый  $\mathcal{R}$ -модуль  $M$  называется *инъективным*, если для произвольного левого  $\mathcal{R}$ -модуля  $L$  и для любого его подмодуля  $K$  каждый гомоморфизм  $\varphi : \mathcal{R}K \rightarrow \mathcal{R}M$  может быть продолжен до гомоморфизма  $\mathcal{R}L \rightarrow \mathcal{R}M$ .

**Теорема 7.7** (Критерий Бэра). Следующие условия эквивалентны:  
 1) левый  $\mathcal{R}$ -модуль  $M$  инъективен;  
 2) для любого идеала  $I \triangleleft \mathcal{R}$  и любого гомоморфизма  $\varphi : \mathcal{R}I \rightarrow \mathcal{R}M$  существует такой элемент  $m \in M$ , что  $\varphi(x) = xm$  для любого  $x \in I$  (т.е. есть гомоморфизм  $\psi : \mathcal{R}I \rightarrow \mathcal{R}M$ , продолжающий  $\varphi$ ).

◀ “1)  $\Rightarrow$  2)” Пусть левый  $\mathcal{R}$ -модуль  $M$  инъективен,  $I \triangleleft \mathcal{R}$ . По определению существует такой гомоморфизм  $\psi : \mathcal{R} \rightarrow M$ , что  $\varphi(x) = \psi(x) = \psi(1 \cdot x) = \psi(1)x$  для любого  $x \in I$ . Значит, можно положить  $m = \psi(1)$ .

“2)  $\Rightarrow$  1)” Мы проверим выполнение свойства инъективности для случая, когда модуль  $L$  — конечный. Пусть  $\mathcal{S}$  — множество всех пар  $(\bar{K}, \bar{\varphi})$ , где  $\bar{K}$  — подмодуль модуля  $L$ ,  $\bar{\varphi}$  — гомоморфизм  $\bar{K}$  в  $M$ , продолжающий  $\varphi$ . Это множество непусто — в нём содержится пара  $(K, \varphi)$ . В силу конечности среди всех таких пар можно выбрать такую пару  $(K_{\max}, \varphi_{\max})$ , в которой  $\bar{K}$  — максимально возможный. Допустим, что  $K_{\max} \neq L$  и выберем произвольный элемент  $b \in L \setminus K_{\max}$ . Рассмотрим идеал  $I = \{r \in \mathcal{R} : rb \in K_{\max}\}$  ( $I$  выдерживает умножение сложение и умножение на элементы кольца, поскольку  $K_{\max}$  — модуль). Тогда отображение  $\theta(r) = \varphi_{\max}(rb)$  есть гомоморфизм  $\theta : I \rightarrow M$ . Выберем для него элемент  $m \in M$  по условию 2 теоремы:  $\theta(x) = xm$  для любого  $x \in I$ . Рассмотрим модуль  $\bar{K} = K_{\max} + \mathcal{R}b$ . Определим  $\bar{\varphi} : \bar{K} \rightarrow M$  правилом  $\bar{\varphi}(x + rb) = \varphi_{\max}(x) + rm$  для любых  $x \in K_{\max}$  и  $r \in \mathcal{R}$ . Проверим, что отображение  $\bar{\varphi}$  определено корректно. Действительно, если  $x_1 + r_1b = x_2 + r_2b$ , то  $r_2 - r_1 \in I$  и  $\varphi_{\max}(x_1) - \varphi_{\max}(x_2) = \varphi_{\max}(b(r_2 - r_1)) = \theta(r_2 - r_1) = (r_2 - r_1)m$ , откуда  $\varphi_{\max}(x_1) + r_1m = \varphi_{\max}(x_2) + r_2m$ . Ясно, что  $\bar{\varphi}|_{K_{\max}} = \varphi_{\max}$ , поэтому пара  $(\bar{K}, \bar{\varphi})$  принадлежит  $\mathcal{S}$ , но это противоречит максимальности модуля  $K_{\max}$ . ▶

Доказательство обратной импликации в общем случае требует применения леммы Цорна.

**Следствие 7.8.** Абелева группа  $A$  (т.е. модуль над кольцом  $\mathbb{Z}$ ) инъективна тогда и только тогда, когда она *делима*, т.е. для любого  $a \in A$  и любого  $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$  существует такой элемент  $x \in A$ , что  $a = nx$ .

◀ Достаточно показать, что выполнение критерия Бэра для группы  $A$  равносильно делимости. Но любой идеал кольца  $\mathbb{Z}$  — главный, т.е. имеет вид  $I = n\mathbb{Z}$ , а любой гомоморфизм  $f : I \rightarrow A$  имеет вид  $f(nz) = f(n)z$  для любого  $z \in \mathbb{Z}$ . Полагая  $f(n) = a$ , получаем  $nt = a$  для элемента  $t$  из условия 2 теоремы 7.7. Случай  $n = 0$  тривиален.

▶

**Теорема 7.9.** Левый модуль  $(\mathcal{R}_{\mathcal{R}})^*$  инъективен.

◀ Пусть  $I$  — идеал кольца  $\mathcal{R}$  и  $f : I \rightarrow (\mathcal{R}_{\mathcal{R}})^*$  — гомоморфизм. Определим гомоморфизм абелевых групп  $\omega : I \rightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$  формулой  $\omega(x) = f(x)(1)$ . В силу делимости группы  $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ , существует характер  $\tilde{\omega} : \mathcal{R} \rightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ , совпадающий с  $\omega$  на  $I$ .

Теперь для любого  $a \in I$  и любого  $x \in \mathcal{R}$  имеем

$$\begin{aligned} (a\tilde{\omega})(x) &\stackrel{(7.2)}{=} \tilde{\omega}(xa) \stackrel{xa \in I}{=} \omega(xa) = f(xa)(1) = \\ &= (xf(a))(1) \stackrel{(7.2)}{=} f(a)(1x) = f(a)(x). \end{aligned}$$

Значит, в силу произвольности  $x \in \mathcal{R}$ ,  $f(a) = a\tilde{\omega}$ , и можно применить критерий Бэра. ▶

### 3°. Квазифробениусов модуль, существование.

Пусть  $M$  — левый  $\mathcal{R}$ -модуль. Для  $S \subseteq M$ ,  $T \subseteq \mathcal{R}$  напомним *аннуляторы*

$$\begin{aligned}\text{ann}_{\mathcal{R}}(S) &= \{r \in \mathcal{R} : rS = 0\}, \\ \text{ann}_M(T) &= \{m \in M : Tm = 0\},\end{aligned}$$

и их свойства  $S \subseteq \text{ann}_M(\text{ann}_{\mathcal{R}}(S))$ ,  $T \subseteq \text{ann}_{\mathcal{R}}(\text{ann}_M(T))$ .

**Определение 7.10.** Модуль  $M$  называется *квазифробениусовым*, или *QF-модулем*, если для всех  $I \triangleleft \mathcal{R}$  и  $K \leq M$  имеют места равенства

$$K = \text{ann}_M(\text{ann}_{\mathcal{R}}(K)), \quad I = \text{ann}_{\mathcal{R}}(\text{ann}_M(I)).$$

В этой ситуации модуль  $K \leq_{\mathcal{R}} M$  также можно рассматривать как модуль над факторкольцом  $\widehat{\mathcal{R}} = \mathcal{R}/\text{ann}_{\mathcal{R}}(K)$ , полагая  $\widehat{r}m = rm$  для  $m \in K$  и  $\widehat{r} = r + \text{ann}_{\mathcal{R}}(K) \in \widehat{\mathcal{R}}$ . Аналогично модуль  $\text{ann}_M(I) \leq_{\mathcal{R}} M$  можно рассматривать как модуль над факторкольцом  $\mathcal{R}/I$ .

**Предложение 7.11.** Пусть  $_{\mathcal{R}}M$  — QF-модуль,  $I \triangleleft \mathcal{R}$  и  $K \leq M$ . Тогда

- 1)  $K$  — QF-модуль над факторкольцом  $\widehat{\mathcal{R}} = \mathcal{R}/\text{ann}_{\mathcal{R}}(K)$ .
- 2)  $\text{ann}_M(I)$  — QF-модуль над факторкольцом  $\mathcal{R}/I$ .

◀ 1) Пусть  $K' \leq_{\widehat{\mathcal{R}}} K$ . Рассмотрим  $\widehat{B} = \text{ann}_{\widehat{\mathcal{R}}}(K')$ . Имеем  $\widehat{B} = B/\text{ann}_{\mathcal{R}}(K)$  для  $B = \text{ann}_{\mathcal{R}}(K')$ . Далее переходим к рассмотрению  $\text{ann}_K(\widehat{B})$ . По определению имеем

$$\begin{aligned}\text{ann}_K(\widehat{B}) &= \{m \in K : \widehat{B}m = 0\} = \{m \in K : Bm = 0\} = \\ &= \text{ann}_K(B) = K \cap \text{ann}_M(B) = K \cap K' = K'.\end{aligned}$$

Использованное здесь равенство  $\text{ann}_M(B) = K'$  верно в силу условия, что модуль  $M$  — квазифробениусов. Таким образом мы получили, что

$$\text{ann}_K(\text{ann}_{\widehat{\mathcal{R}}}(K')) = K'.$$

Также доказывается равенство  $\text{ann}_{\widehat{\mathcal{R}}}(\text{ann}_K(\widehat{B})) = \widehat{B}$  для произвольного идеала  $\widehat{B} \triangleleft \widehat{\mathcal{R}}$ .

Утверждение 2) доказывается аналогично. ▶

Следующая теорема показывает существование квазифробениусова модуля.

**Теорема 7.12.** Модуль  ${}_{\mathcal{R}}\mathcal{R}^*$  характеров модуля  $\mathcal{R}_{\mathcal{R}}$  является  $QF$ -модулем.

◀ 1) Рассмотрим идеал  $I \triangleleft \mathcal{R}$  и его аннулятор  $K = \text{ann}_{\mathcal{R}^*}(I) = \{\chi \in \mathcal{R}^* : I\chi = 0\}$ . Поскольку для  $r, s \in \mathcal{R}$   $(r\chi)(s) = \chi(rs)$ , то из условия  $\chi \in K$ , т.е.  $I\chi = 0$ , получаем, что  $\chi(rs) = 0$  для  $r \in I$ . Подставляя  $s = 1$ , получаем  $\chi(r) = 0$ . Значит,  $K$  — это те характеры  $\chi \in \mathcal{R}^*$ , что  $I \subseteq \ker \chi$ . Такие характеры корректно рассматривать как характеры факторгруппы  $\widehat{\mathcal{R}} = \mathcal{R}/I$ . При этом  $K$  — множество всех характеров группы  $\widehat{\mathcal{R}}$ .

Нам нужно доказать, что  $\text{ann}_{\mathcal{R}}(K) = I$ . Включение  $I \subseteq \text{ann}_{\mathcal{R}}(K)$  всегда выполнено. Проверим, что  $\text{ann}_{\mathcal{R}}(K) \subseteq I$ . Пусть  $r \in \text{ann}_{\mathcal{R}}(K)$ . Тогда элемент  $\widehat{r} = r + I \in \widehat{\mathcal{R}}$  аннулируется любым характером из  $K$ . Согласно утверждению (2) предложения 7.2 это означает, что  $\widehat{r} = 0$ , т.е.  $r \in I$  и  $\text{ann}_{\mathcal{R}}(K) \subseteq I$ .

2) Рассмотрим подмодуль  $K \leq {}_{\mathcal{R}}\mathcal{R}^*$  и его аннулятор  $I = \text{ann}_{\mathcal{R}}(K)$ . По теореме 7.4 о каноническом изоморфизме отождествим  $\mathcal{R}$  с модулем характеров  $\mathcal{R}^{**}$ . Тогда  $I$  — это множество всех характеров модуля  $\mathcal{R}^*$ , аннулирующих  $K$ , поэтому также как и в пункте (1) получаем, что  $\text{ann}_{\mathcal{R}^*}(I) = K$ . ▶

#### 4°. Квазифробениусов модуль, единственность.

Сперва сделаем редукцию к случаю локальных колец.

По теореме 6.16 имеем  $\mathcal{R} = \mathcal{R}_1 \oplus \dots \oplus \mathcal{R}_n$ , где все  $\mathcal{R}_i$  — локальные кольца,  $\mathcal{R}_i \cong \mathcal{R}e_i$ . Тогда  ${}_{\mathcal{R}}M = M_1 \oplus \dots \oplus M_n$ , где  $M_s = e_s M$  —  $\mathcal{R}_s$ -модуль,  $s = 1, \dots, n$ .

**Предложение 7.13.** В вышеозначенных обозначениях  ${}_{\mathcal{R}}M$  —  $QF$ -модуль тогда и только тогда, когда  ${}_{\mathcal{R}_1}M_1, \dots, {}_{\mathcal{R}_n}M_n$  есть  $QF$ -модули.

◀ Произвольный подмодуль  $K \leq {}_{\mathcal{R}}M$  имеет разложение  $K = K_1 \oplus \dots \oplus K_n$ , где  $K_s = e_s K \leq {}_{\mathcal{R}_s}M_s$ . Имеем

$$\text{ann}_{\mathcal{R}}(K) = \text{ann}_{\mathcal{R}_1}(K_1) \oplus \dots \oplus \text{ann}_{\mathcal{R}_n}(K_n)$$

(действительно,  $0 = rK = (re_1 + \dots + re_n)K = re_1K_1 + \dots + re_nK_n \Leftrightarrow re_i \in \text{ann}_{\mathcal{R}_i}(K_i)$ ) и

$$\text{ann}_M(\text{ann}_{\mathcal{R}}(K)) = \text{ann}_{M_1}(\text{ann}_{\mathcal{R}_1}(K_1)) \oplus \dots \oplus \text{ann}_{M_n}(\text{ann}_{\mathcal{R}_n}(K_n)).$$

Откуда равенство  $\text{ann}_M(\text{ann}_{\mathcal{R}}(K)) = K$  эквивалентно системе равенств  $\text{ann}_{M_s}(\text{ann}_{\mathcal{R}_s}(K_s)) = K_s$ ,  $s = 1, \dots, n$ . Аналогично, произвольный идеал  $I \triangleleft \mathcal{R}$  раскладывается в сумму  $I = I_1 \oplus \dots \oplus I_n$ ,

$I_s = e_s I \triangleleft \mathcal{R}_s$ . Поэтому равенство  $\text{ann}_{\mathcal{R}}(\text{ann}_M(I)) = I$  эквивалентно системе равенств  $\text{ann}_{\mathcal{R}_s}(\text{ann}_{M_s}(I_s)) = I_s$ ,  $s = 1, \dots, n$ . ►

Отметим следующее полезное свойство: подмодули  $QF$ -модуля, имеющие одинаковые аннуляторы, равны. Действительно, если  $\text{ann}_{\mathcal{R}}(K) = \text{ann}_{\mathcal{R}}(K')$ , то

$$K = \text{ann}_M(\text{ann}_{\mathcal{R}}(K)) = \text{ann}_M(\text{ann}_{\mathcal{R}}(K')) = K'.$$

Аналогично, идеалы кольца, имеющие одинаковые аннуляторы в  $QF$ -модуле, равны (если  $\text{ann}_M(I) = \text{ann}_M(I')$ , то;  $I = \text{ann}_{\mathcal{R}}(\text{ann}_M(I)) = \text{ann}_{\mathcal{R}}(\text{ann}_M(I')) = I'$ ).

Модуль  ${}_{\mathcal{R}}M$  называется *точным*, если  $\text{ann}_{\mathcal{R}}(M) = 0$ . Произвольный  $QF$ -модуль  $M$  является точным, поскольку  $M = \text{ann}_M(\text{ann}_{\mathcal{R}}(M)) = \text{ann}_M(0)$ , а значит,  $\text{ann}_{\mathcal{R}}(M) = 0$ .

Для точного модуля над локальным кольцом свойство быть  $QF$ -модулем связано с его цоколем. Вспомним, что  $\text{soc}M = \text{ann}_M(J(\mathcal{R}))$ , поэтому как отмечено выше для произвольного идеала  $I$  и его аннулятора,  $\text{soc}M$  можно рассматривать как модуль над факторкольцом  $\overline{\mathcal{R}} = \mathcal{R}/J(\mathcal{R})$ , что в случае локального кольца означает пространство над полем.

**Теорема 7.14.** Для точного модуля  ${}_{\mathcal{R}}M$  над локальным кольцом  $\mathcal{R}$  эквивалентны следующие условия:

- 1)  ${}_{\mathcal{R}}M \cong {}_{\mathcal{R}}\mathcal{R}^*$ ;
- 2)  $M$  —  $QF$ -модуль;
- 3)  $\text{soc}M$  — циклический подмодуль в  $M$ ;
- 4)  $\dim_{\overline{\mathcal{R}}} \text{soc}M = 1$ ;
- 5)  $\text{soc}M$  — единственный минимальный (неприводимый) подмодуль модуля  $M$ ;
- 6) модуль  $M$  содержит единственный минимальный подмодуль.

◀ Импликация “1)  $\Rightarrow$  2)” есть утверждение теоремы 7.12.

“2)  $\Rightarrow$  3)” Пусть  $a \in \text{soc}M \setminus \{0\}$ . Имеем  $J(\mathcal{R}) \subseteq \text{ann}_{\mathcal{R}}(\mathcal{R}a) \neq \mathcal{R}$  (например,  $1 \notin \text{ann}_{\mathcal{R}}(\mathcal{R}a)$ ). С другой стороны, в локальном кольце любой элемент вне радикала обратим, а идеал, содержащий обратимый элемент, содержит и единицу кольца, т.е. это всё кольцо. Поэтому  $J(\mathcal{R})$  — максимальный идеал, т.е. между  $J(\mathcal{R})$  и  $\mathcal{R}$  нет других идеалов. Следовательно,  $\text{ann}_{\mathcal{R}}(\mathcal{R}a) = J(\mathcal{R}) = \text{ann}_{\mathcal{R}}(\text{soc}M)$ . Откуда пользуясь свойством  $QF$ -модуля, заключаем, что  $\text{soc}M = \mathcal{R}a$  — циклический модуль.

“3)  $\Rightarrow$  4)  $\Rightarrow$  5)  $\Rightarrow$  6)” следует из предложений 6.38 и 6.39.

“6)  $\Rightarrow$  1)” Пусть  $K$  — единственный минимальный подмодуль модуля  $M$ . Тогда в силу минимальности он не содержит собственных подмодулей, т.е.  $K$  — неприводимый модуль. Согласно предложению 6.39 все неприводимые  $\mathcal{R}$ -модули изоморфны, поэтому существует вложение  $\varphi : \mathcal{R}K \rightarrow \mathcal{R}\mathcal{R}^*$ . В силу инъективности модуля характеров (теорема 7.9) вложение  $\varphi$  может быть продолжено до гомоморфизма  $\psi : \mathcal{R}M \rightarrow \mathcal{R}\mathcal{R}^*$ . Рассмотрим ядро  $\ker \psi$ . Если  $\ker \psi \neq 0$ , то из условия 6) мы получим, что  $K \subseteq \ker \psi$ , противоречие с тем, что  $\psi$  на  $K$  совпадает с  $\varphi$ . Следовательно,  $\ker \psi = 0$ , и  $\psi$  — вложение. Допустим, что  $\psi(M) \neq \mathcal{R}^*$ . Поскольку по теореме 7.12  $\mathcal{R}^* - QF$ -модуль, то  $\text{ann}_{\mathcal{R}}(\psi(M)) \neq \text{ann}_{\mathcal{R}}(\mathcal{R}^*) = 0$ . С другой стороны, т.к.  $\psi$  — вложение, то  $\text{ann}_{\mathcal{R}}(\psi(M)) = \text{ann}_{\mathcal{R}}(M)$ . Условие  $\text{ann}_{\mathcal{R}}(M) \neq 0$  противоречит точности модуля  $M$ . Следовательно,  $\psi(M) = \mathcal{R}^*$  и  $\psi$  — искомый изоморфизм.  $\blacktriangleright$

**Теорема 7.15.** Любой  $QF$ -модуль над конечным коммутативным кольцом  $\mathcal{R}$  с единицей изоморфен модулю характеров  $\mathcal{R}\mathcal{R}^*$ .

$\blacktriangleleft$  Следует из предложения 7.13, утверждений 1) и 2) теоремы 7.14 и предложения 7.5.  $\blacktriangleright$

**Следствие 7.16.** Любой  $QF$ -модуль над конечным коммутативным кольцом  $\mathcal{R}$  с единицей инъективен.

### Задачи к лекции 7.

**Задача 1.** Верно ли, что абелева группа  $\mathbb{Z}^{**}$  изоморфна группе  $\mathbb{Z}$ ?

**Задача 2.** Модуль называется *неразложимым*, если его нельзя представить как прямую сумму двух ненулевых подмодулей. Покажите, что конечный инъективный модуль неразложим тогда и только тогда, когда его цоколь — простой модуль.

**Задача 3.** Приведите пример конечного неразложимого модуля, цоколь которого не прост.

**Задача 4.** Распишите доказательство оставшихся пунктов предложения 7.11.

**Задача 5.** Приведите пример конечного модуля, не являющегося точным.

**Задача 6.** Пусть  $M$  — квазифробениусов модуль. Докажите, что любой его подмодуль тоже квазифробениусов.

**Лекция 8. Характеризация квазифробениусовых модулей с помощью различающих характеров. Линейные коды над квазифробениусовым модулем, двойственность между кодами над кольцом и кодами над квазифробениусовым модулем.**

Пусть  $M$  — левый  $\mathcal{R}$ -модуль. Договоримся при необходимости рассматривать  $M$  и как правый модуль, полагая  $rm = mr$  для любых  $r \in \mathcal{R}$ ,  $m \in M$ .

**Определение 8.1.** Назовём модуль  $M$  *различимым*, если существует характер  $\chi \in M^*$ , не равный тождественно нулю ни на каком ненулевом подмодуле модуля  $M$ . Такой характер  $\chi$  назовём *различающим* для  $M$ .

Следующая лемма даёт эквивалентное определение различающего характера, из которого более понятен сам термин “различающий”.

**Лемма 8.2.** Характер  $\chi \in M^*$  является различающим тогда и только тогда, когда

$$\forall a, b \in M, a \neq b, \exists r \in \mathcal{R} : \chi(ra) \neq \chi(rb).$$

◀ “ $\Rightarrow$ ” Пусть  $\chi$  — различающий характер и  $a, b \in M$ ,  $a \neq b$ . Рассмотрим ненулевой подмодуль  $\mathcal{R}(a - b) \leq M$ . Имеем  $\chi(\mathcal{R}(a - b)) \neq 0$ , значит, существует элемент  $r \in \mathcal{R}$  такой, что  $\chi(r(a - b)) \neq 0$ . Следовательно,  $\chi(ra) \neq \chi(rb)$  (по свойству гомоморфизма).

“ $\Leftarrow$ ” Пусть  $K \leq M$  — произвольный ненулевой подмодуль. Существует  $a \in K \setminus \{0\}$ . По условию существует элемент  $r \in \mathcal{R}$  такой, что  $\chi(ra) \neq \chi(r0) = 0$ . Значит,  $\chi(K) \neq 0$ . ▶

**Лемма 8.3.**  $QF$ -модуль  ${}_{\mathcal{R}}M$  является различимым.

◀ По теореме 7.15 можно считать, что  $M = \mathcal{R}^*$ . Тогда в силу теоремы 7.4 существует канонический изоморфизм  $\mathcal{R}$ -модулей  $\varphi : {}_{\mathcal{R}}\mathcal{R} \rightarrow {}_{\mathcal{R}}\mathcal{R}^{**} = {}_{\mathcal{R}}M^*$ , который ставит в соответствие элементу  $r \in \mathcal{R}$  характер  $\varphi(r) : \mathcal{R}^* \rightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ , действующий на элементе  $\chi \in \mathcal{R}^*$  по правилу  $\varphi(r)(\chi) = \chi(r)$ . Покажем, что характер  $\varphi(1)$  является различающим для  $\mathcal{R}^*$ . Действительно, если  $\chi, \psi \in \mathcal{R}^*$ ,  $\chi \neq \psi$ , то  $\chi(r) \neq \psi(r)$  для некоторого  $r \in \mathcal{R}$ . Это означает, что  $\varphi(1)(r\chi) \neq \varphi(1)(r\psi)$ . Согласно лемме 8.2 получаем, что  $\varphi(1)$  — различающий характер для модуля  ${}_{\mathcal{R}}M$ . ▶

Заметим, что в предыдущем доказательстве вместо 1 можно было взять любой обратимый элемент  $u$  кольца  $\mathcal{R}$ , характер  $\varphi(u)$  также будет различающим.

Покажем, что верно обратное утверждение к лемме 8.3.

Сперва сделаем редукцию к случаю локальных колец.

По теореме 6.16 имеем  $\mathcal{R} = \mathcal{R}_1 \oplus \dots \oplus \mathcal{R}_n$ , где все  $\mathcal{R}_i$  — локальные кольца,  $\mathcal{R}_i \cong \mathcal{R}e_i$ . Тогда  ${}_{\mathcal{R}}M = M_1 \oplus \dots \oplus M_n$ , где  $M_s = e_s M$  —  $\mathcal{R}_s$ -модуль,  $s = 1, \dots, n$ .

**Лемма 8.4.** В вышеозначенных обозначениях модуль  ${}_{\mathcal{R}}M$  различим тогда и только тогда, когда все модули  ${}_{\mathcal{R}_1}M_1, \dots, {}_{\mathcal{R}_n}M_n$  различимы.

◀ “ $\Rightarrow$ ” Пусть  $\chi$  — различающий характер модуля  $M$ . Поскольку произвольный подмодуль  $K_s$  модуля  ${}_{\mathcal{R}_s}M_s$  является подмодулем модуля  ${}_{\mathcal{R}}M$ , то на ненулевом подмодуле  $\chi(K_s) \neq 0$ . Тогда ограничение  $\chi$  на  $M_s$  будет искомым различающим характером модуля  ${}_{\mathcal{R}_s}M_s$ .

“ $\Leftarrow$ ” Пусть все модули  ${}_{\mathcal{R}_1}M_1, \dots, {}_{\mathcal{R}_n}M_n$  различимы,  $\chi_1, \dots, \chi_n$  — их различающие характеры. Определим характер  $\chi$  модуля  $M$  следующим образом: для произвольного элемента  $a \in M$  берём его разложение  $a = a_1 + \dots + a_n$ ,  $a_s \in M_s$ , соответствующее разложению  $M$  в прямую сумму и полагаем  $\chi(a) = \chi_1(a_1) + \dots + \chi_n(a_n) \in \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ . Из построения очевидно, что полученное отображение будет характером модуля  $M$ . Докажем, что он будет различающим. Пусть  $K \leq M$ ,  $K \neq 0$ . В этом случае найдётся такой индекс  $s \in \{1, \dots, n\}$ , что  $K_s = e_s K \neq 0$ . Тогда из условия, что  $K_s$  — ненулевой подмодуль модуля  $M_s$ , заключаем, что найдётся элемент  $a_s \in K_s$ , для которого  $\psi_s(a_s) \neq 0$ . Рассматривая  $a_s$  как элемент модуля  $K$ , получаем  $\chi(a_s) = \chi_s(a_s) \neq 0$ , т.е.  $\chi(K) \neq 0$ . ▶

**Лемма 8.5.** Пусть  ${}_{\mathcal{R}}M$  — точный модуль над локальным кольцом  $\mathcal{R}$ . Вспомним, что  $\text{soc}M = \text{ann}_M(J(\mathcal{R}))$  и  $\text{soc}M$  можно рассматривать как модуль над факторкольцом  $\overline{\mathcal{R}} = \mathcal{R}/J(\mathcal{R})$ , что в случае локального кольца означает пространство над конечным полем. Обозначим  $|\overline{\mathcal{R}}| = q = p^r$ . Пусть  $u_1, \dots, u_r$  — произвольный базис поля  $\overline{\mathcal{R}}$  над его простым подполем  $\mathbb{F}_p$ . Для произвольной подгруппы  $H < (\text{soc}M, +)$  обозначим через  $L(H)$  сумму всех подпространств пространства  ${}_{\overline{\mathcal{R}}}\text{soc}M$ , содержащихся в  $H$ , другими словами самое большое подпространство, содержащееся в  $H$ . Тогда  $L(H) = \bigcap_{i=1}^r u_i^{-1}H$ .

◀ Покажем, что  $L(H) = \bigcap_{i=1}^r u_i^{-1}H$ . Пусть  $a \in L(H)$ . По построению,

это равносильно тому, что  $\overline{\mathcal{R}}a \subseteq H$ . В частности, для всех  $i = 1, \dots, r$  имеем  $u_i a \in H$  и  $a \in u_i^{-1}G$ . Таким образом,  $L(H) \subseteq \bigcap_{i=1}^r u_i^{-1}H$ . Наоборот, если  $a \in \bigcap_{i=1}^r u_i^{-1}H$ , то  $u_1 a, \dots, u_r a \in H$ . Поскольку  $H$  — группа, то  $(\gamma_1 u_1 + \dots + \gamma_r u_r)a \in H$  для всех  $\gamma_1, \dots, \gamma_r \in \mathbb{F}_p$ . Вспоминая, что  $u_1, \dots, u_r$  — базис  $\overline{\mathcal{R}}$  над  $\mathbb{F}_p$ , заключаем, что  $\overline{\mathcal{R}}a \subseteq H$  и, следовательно,  $a \in L(H)$ . ►

**Лемма 8.6.** Различимый точный модуль  $\mathcal{R}M$  над локальным кольцом  $\mathcal{R}$  является  $QF$ -модулем.

◄ Пусть  $\chi$  — различающий характер модуля  $\mathcal{R}M$ . Согласно пункту 4) теоремы 7.14 для того, чтобы доказать лемму, достаточно показать, что  $\dim_{\overline{\mathcal{R}}} \text{soc}M = 1$ . Рассуждая от противного, предположим, что  $\dim_{\overline{\mathcal{R}}} \text{soc}M > 1$ . В этом случае  $|\text{soc}M| = q^{\dim_{\overline{\mathcal{R}}} \text{soc}M} \geq q^2$ .

Рассмотрим ограничение  $\overline{\chi}$  характера  $\chi$  на  $\text{soc}M$ . Пусть  $G = \ker \overline{\chi}$ . Поскольку группа  $(\text{soc}M, +)$  как аддитивная группа конечно-пространства над полем характеристики  $p$  является элементарной  $p$ -группой, и  $\chi(\text{soc}M) \neq 0$  в силу выбора характера  $\chi$ , то  $\overline{\chi}(\text{soc}M)$  — подгруппа порядка  $p$  в  $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ . Следовательно,  $G$  — подгруппа индекса  $p$  в  $\text{soc}M$ . Для подпространства  $L(G)$ , определённого в лемме 8.5, из утверждения  $L(G) = \bigcap_{i=1}^r u_i^{-1}G$  и значения индекса группы  $G$  следует, что  $L(G)$  — подгруппа индекса, не превосходящего  $p^r = q$ . Тогда из ограничений на индекс  $L(G)$  и на мощность  $\text{soc}M$  следует, что  $L(G) \neq 0$ . Таким образом, в группе  $G = \ker \overline{\chi}$  содержится ненулевое подпространство  $L(G)$ . При этом  $L(G)$  — подмодуль модуля  $\overline{\mathcal{R}}M$  (см. замечание перед предложением 6.38). Имеем  $\chi(L(G)) = 0$ , противоречие с тем, что  $\chi$  — различающий характер модуля  $\mathcal{R}M$ . ►

**Теорема 8.7.** Точный модуль  $\mathcal{R}M$  является различимым тогда и только тогда, когда он есть  $QF$ -модуль.

◄ Получается объединением лемм 8.3–8.4 и 8.6, с использованием предложения 7.13. ►

В данной лекции мы обобщим материал Лекции 4 на случай линейных кодов над кольцами и квазифробениусовыми модулями.

### 1°. Коды над квазифробениусовым модулем.

**Теорема 8.8.** Пусть  $M$  — левый  $\mathcal{R}$ -модуль. Следующие условия эквивалентны:

- 1)  $\mathcal{R}M$  есть  $QF$ -модуль;
- 2) для любого  $N \in \mathbb{N}$  и любых линейных кодов  $\mathcal{C} \leq \mathcal{R}\mathcal{R}^N$ ,  $\mathcal{K} \leq \mathcal{R}M^N$  выполнены равенства

$$\text{ann}_{M^N}(\text{ann}_{\mathcal{R}^N}(\mathcal{K})) = \mathcal{K}, \quad (8.1)$$

$$\text{ann}_{\mathcal{R}^N}(\text{ann}_{M^N}(\mathcal{C})) = \mathcal{C}; \quad (8.2)$$

- 3)  $\mathcal{R}M$  — точный модуль и для любого  $N \in \mathbb{N}$  и любого линейного кода  $\mathcal{K} \leq \mathcal{R}M^N$  выполнено равенство (8.1).

◀ “1)  $\Rightarrow$  2)” По теореме 7.15 можно считать, что  $M = \mathcal{R}^*$ . В этом случае согласно предложению 7.5, можно также считать, что  $M^N = (\mathcal{R}^N)^*$ . Тогда  $\mathcal{L} = \text{ann}_{M^N}(\mathcal{C})$  — множество характеров группы  $\mathcal{R}^N$ , аннулирующих  $\mathcal{C}$ , и  $\text{ann}_{\mathcal{R}^N}(\mathcal{L})$  — подгруппа элементов из  $\mathcal{R}^N$ , аннулируемых всеми характерами из  $\mathcal{L}$ . Повторяя рассуждения из доказательства теоремы 7.12, приходим к тому, что выполнено равенство (8.2). Равенство (8.1) доказывается аналогично путём отождествления  $\mathcal{R}^N = (M^N)^*$  (с использованием теоремы 7.4).

“2)  $\Rightarrow$  3)” Очевидно.

“3)  $\Rightarrow$  1)” На основании предложения 7.13 достаточно рассмотреть случай, когда  $\mathcal{R}$  — локальное кольцо. Пусть  $\mathcal{R}M$  — не  $QF$ -модуль. Тогда по теореме 7.14 в  $\text{soc}M = \text{ann}(J(\mathcal{R}))$  содержится некоторый собственный подмодуль  $\mathcal{K}$ . Тогда  $\text{ann}_{\mathcal{R}}(\mathcal{K}) = J(\mathcal{R})$  (большого собственного идеала в  $\mathcal{R}$  нет), но  $\text{ann}_M(\text{ann}_{\mathcal{R}}(\mathcal{K})) = \text{soc}M \neq \mathcal{K}$ , противоречие с (8.1) для  $N = 1$ . ►

Напомним определение проверочной матрицы.

**Определение 8.9.** Пусть  $M$  — левый  $\mathcal{R}$ -модуль и  $\mathcal{K}$  — код над  $M$  длины  $n$ . Матрица  $H = (h_{ij})$  размера  $r \times n$  над кольцом  $\mathcal{R}$  называется *проверочной матрицей* кода  $\mathcal{K}$  длины  $n$  над  $M$ , если

$$\mathcal{K} = \{\mathbf{a} \in M^n : H\mathbf{a}^T = 0\}. \quad (8.3)$$

Пусть  $\mathcal{H}$  — линейный код над  $\mathcal{R}$ , порождённый строками матрицы  $H$ ,  $\mathcal{H} \leq \mathcal{R}\mathcal{R}^n$ . Тогда из определения видно, что  $H$  — проверочная

матрица кода  $\mathcal{K}$  в том и только в том случае, если  $\mathcal{K} = \text{ann}_{M^n}(\mathcal{H})$ , т.е.  $\mathcal{K}$  — двойственный код к  $\mathcal{H}$ .

Для кодов над модулями и даже над кольцами проверочная матрица существует далеко не всегда, однако сейчас мы увидим, что именно для класса квазифробениусовых модулей утверждение о существовании проверочной матрицы верно.

**Предложение 8.10.** Пусть  $\mathcal{R}M$  — точный модуль. Тогда любой линейный код над  $M$  имеет проверочную матрицу над  $\mathcal{R}$  тогда и только тогда, когда  $\mathcal{R}M$  есть  $QF$ -модуль.

◀ “ $\Rightarrow$ ” Если  $\mathcal{R}M$  есть  $QF$ -модуль и  $\mathcal{K} \leq \mathcal{R}M^n$ , то в силу равенства (8.1) матрица  $H$  над  $\mathcal{R}$ , строки которой порождают код  $\mathcal{H} = \text{ann}_{\mathcal{R}^n}(\mathcal{K})$ , есть проверочная для  $\mathcal{K}$ .

“ $\Leftarrow$ ” Если любой код  $\mathcal{K} \leq \mathcal{R}M^n$  имеет проверочную матрицу над  $\mathcal{R}$ , т.е. выполнено  $\mathcal{K} = \text{ann}_{M^n}(\mathcal{H})$  для некоторого кода  $\mathcal{H} \leq \mathcal{R}\mathcal{R}^n$ , то верно равенство (8.1) и по теореме 8.8  $\mathcal{R}M$  есть  $QF$ -модуль. ▶

Пусть  $\mathcal{C} \leq \mathcal{R}\mathcal{R}^n$  — линейный код над кольцом. Если  $\mathcal{R}$  не является полем, то проверочной матрицы для  $\mathcal{C}$  над  $\mathcal{R}$  опять же может не существовать, но возможно построить проверочную матрицу над  $QF$ -модулем. Договоримся при необходимости рассматривать левый  $\mathcal{R}$ -модуль  $M$  и как правый модуль, полагая  $rm = mr$  для любых  $r \in \mathcal{R}$ ,  $m \in M$ .

**Определение 8.11.** Пусть  $\mathcal{C}$  — код над  $\mathcal{R}$  длины  $n$ ,  $M$  — левый  $\mathcal{R}$ -модуль. Матрица  $K$  размера  $m \times n$  над модулем  $M$  называется *проверочной матрицей* кода  $\mathcal{C}$ , если

$$\mathcal{C} = \{ \mathbf{a} \in \mathcal{R}^n : K\mathbf{a}^T = 0 \}. \quad (8.4)$$

Пусть  $\mathcal{K}$  — линейный код над  $M$ , порождённый строками матрицы  $K$ ,  $\mathcal{K} \leq \mathcal{R}M^n$ . Тогда из определения видно, что  $K$  — проверочная матрица кода  $\mathcal{C}$  в том и только в том случае, если  $\mathcal{C} = \text{ann}_{\mathcal{R}^n}(\mathcal{K})$ , и проверочная матрица для  $\mathcal{C}$  над  $M$  существует тогда и только тогда, когда условию  $\mathcal{C} = \text{ann}_{\mathcal{R}^n}(\mathcal{K})$  удовлетворяет код  $\mathcal{K} = \text{ann}_{M^n}(\mathcal{C})$ . В этом случае строки матрицы  $K$  выбираются как система образующих модуля  $\mathcal{K}$ . Из теоремы 8.8 получаем

**Предложение 8.12.** Любой линейный код над кольцом  $\mathcal{R}$  имеет проверочную матрицу над  $QF$ -модулем  $\mathcal{R}M$ .

Обращение этого утверждения неверно.

Пусть  $\mathcal{R}\mathcal{R}^{(N)}$  — модуль столбцов высоты  $N$  над кольцом  $\mathcal{R}$ .

**Определение 8.13.** Назовём матрицу  $K$  размера  $m \times N$  над модулем  $\mathcal{R}M$  *проверочной* для матрицы  $H$  размера  $N \times n$  над кольцом  $\mathcal{R}$ , если для любого столбца  $b^\downarrow \in \mathcal{R}^{(N)}$  система  $Hx^\downarrow = b^\downarrow$  разрешима тогда и только тогда, когда  $Kb^\downarrow = 0^\downarrow$ .

Над полем любая матрица  $H$  имеет проверочную матрицу  $K$  и размерность  $d$  многообразия решений любой совместной системы  $Hx^\downarrow = b^\downarrow$  удовлетворяет равенствам  $d = n - \text{rk}H = \text{rk}K + n - N$ . Это утверждение допускает обобщение на случай квазифробениусова модуля:

**Предложение 8.14.** Любая матрица  $H$  размера  $N \times n$  над кольцом  $\mathcal{R}$  имеет проверочную матрицу  $K$  размера  $m \times N$  над  $QF$ -модулем  $\mathcal{R}M$ . При этом если  $\mathcal{H}$  — линейный код над  $\mathcal{R}$ , порождённый столбцами матрицы  $H$ ,  $\mathcal{K}$  — линейный код над  $M$ , порождённый строками матрицы  $K$ , то число  $D = D(H)$  решений любой совместной системы  $Hx^\downarrow = b^\downarrow$  равно

$$D = |\mathcal{H}|^{-1}|\mathcal{R}|^n = |\mathcal{K}||\mathcal{R}|^{n-N}.$$

◀ Согласно предложению 8.12, существует матрица  $K$  над  $M$  такая, что для любого  $b^\downarrow \in \mathcal{R}^{(N)}$

$$b^\downarrow \in \mathcal{H} \Leftrightarrow Kb^\downarrow = 0^\downarrow.$$

Матрица  $K$  — искомая, поскольку условие  $b^\downarrow \in \mathcal{H}$  есть критерий совместности системы  $Hx^\downarrow = b^\downarrow$ .

Докажем равенство  $D = |\mathcal{H}|^{-1}|\mathcal{R}|^n$ . Обозначим  $h_i^\downarrow$  —  $i$ -ый столбец матрицы  $H$ . Рассмотрим гомоморфизм  $\mathcal{R}$ -модулей  $\varphi : \mathcal{R}^n \rightarrow \mathcal{H}$ ,  $\varphi((x_1, \dots, x_n)) = \sum_{i=1}^n x_i h_i^\downarrow$ . По построению  $D = |\ker \varphi|$ . По теореме о гомоморфизме для модулей в силу сюръективности отображения  $\varphi$  имеем  $\mathcal{H} \cong \mathcal{R}^n / \ker \varphi$ . Поэтому  $D = |\ker \varphi| = |\mathcal{H}|^{-1}|\mathcal{R}|^n$ . Поскольку  $\mathcal{K}$  — двойственный код к  $\mathcal{H}$ ,  $\mathcal{K} = \text{ann}_{M^N}(\mathcal{H})$ . Вспомним, что  $\text{ann}_{M^N}(\mathcal{H})$  можно рассматривать как группу характеров факторгруппы  $\mathcal{R}^N / \mathcal{H}$ , что в силу утверждения 1) предложения об изоморфизме с группой характеров, влечёт равенство  $|\text{ann}_{M^N}(\mathcal{H})| = |\mathcal{R}^N / \mathcal{H}|$ . Значит,  $|\mathcal{K}| \cdot |\mathcal{H}| = \mathcal{R}^N$ , откуда следует, что  $D = |\mathcal{K}||\mathcal{R}|^{n-N}$ . ▶

## 2°. Теорема Мак-Вильямс над $QF$ -модулями

На лекции 2 мы показали, что теорема А.А. Маркова справедлива над любым алфавитом, в частности, для кодов над  $QF$ -модулями.

Теорему Мак-Вильямса о продолжении изометрии так же можно обобщить на этот случай.

**Определение 8.15.** Пусть  $M_{\mathcal{R}}$  — модуль над кольцом  $\mathcal{R}$ . Линейные коды  $\mathcal{C}, \mathcal{L} \leq M^n$  линейно изометричны, если существует изоморфизм  $\mathcal{R}$  модулей

$$\tau : \mathcal{R}\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{R}\mathcal{L} \quad (8.5)$$

такой, что

$$d(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = d(\tau(\mathbf{a}), \tau(\mathbf{b})) \quad \forall \mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathcal{C}. \quad (8.6)$$

**Теорема 8.16** (Хейфец, 2001). Пусть  $M$  —  $\mathbb{QF}$ -модуль над локальным кольцом  $\mathcal{R}$ . Тогда любая линейная изометрия линейных кодов (8.5) продолжается до линейного мономиального преобразования пространства Хэмминга  $M^n$ .

◀ Без доказательства. ▶

### Задачи к лекции 8.

**Задача 1.** а) Покажите, что для кода над кольцом число строк порождающей матрицы не меньше размерности кода.

б) Приведите пример кода над модулем, имеющего порождающую матрицу, число строк которой меньше размерности кода.

**Задача 2.** Распишите доказательство первой импликации в доказательстве теоремы 8.8.

**Задача 3.** Пусть  $\mathcal{R}Q$  —  $QF$ -модуль, рассмотрим модуль  $M = Q \oplus Q$ . Покажите, что  $M$  не  $QF$ -модуль, но любой линейный код над  $\mathcal{R}$  имеет проверочную матрицу над  $M$ .

**Задача 4.** Пусть  $\mathcal{R} = \mathbb{Z}_4$ . Рассмотрим линейный код над  $\mathcal{R}$  с порождающей матрицей  $G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ . Найдите его проверочную матрицу над  $QF$ -модулем.

**Лекция 9.** Общая весовая функция линейного кода над кольцом и над модулем. Тождество Мак-Вильямс для линейных кодов над кольцом и над квазифробениусовым модулем. Пространство последовательностей над кольцом как модуль над кольцом многочленов. Линейные рекуррентные последовательности (ЛРП). Характеристический многочлен ЛРП. Порождающие элементы модуля ЛРП. Импульсная последовательность. Генератор ЛРП. Минимальный многочлен ЛРП над полем и его свойства. Аннулятор ЛРП.

Пусть  $\mathcal{R}$  — конечное коммутативное кольцо с  $1 \neq 0$ . Положим  $|\mathcal{R}| = r$ ,  $\mathcal{R} = \{\rho_1, \dots, \rho_r\}$ . Пусть также  $M$  — левый  $\mathcal{R}$ -модуль,  $|M| = m$ ,  $M = \{\mu_1, \dots, \mu_m\}$ .

**Определение 9.1.** *Общей весовой функцией* кода  $\mathcal{C} \leq_{\mathcal{R}} \mathcal{R}^N$  называется многочлен

$$W_{\mathcal{C}}(x_1, \dots, x_r) = \sum_{\mathbf{u} \in \mathcal{C}} x_1^{s_1(\mathbf{u})} \dots x_r^{s_r(\mathbf{u})}$$

над  $\mathbb{Z}$ , где  $s_t(\mathbf{u})$  — число координат слова  $\mathbf{u}$ , равных  $\rho_t$ .

Аналогично, *общей весовой функцией* кода  $\mathcal{K} \leq_{\mathcal{R}} M^N$  называется многочлен

$$W_{\mathcal{K}}(y_1, \dots, y_m) = \sum_{\mathbf{a} \in \mathcal{K}} y_1^{\sigma_1(\mathbf{a})} \dots y_m^{\sigma_m(\mathbf{a})}$$

над  $\mathbb{Z}$ , где  $\sigma_t(\mathbf{a})$  — число координат слова  $\mathbf{a}$ , равных  $\mu_t$ .

Очевидно, что это однородные многочлены степени  $N$ .

Напомним, что *комплексный характер* группы  $G$  — это гомоморфизм этой группы в группу  $(\mathbb{C}^*, \cdot)$  (мультипликативную группу поля комплексных чисел).

Для любого рационального характера  $\omega \in M^*$ ,  $\omega : M \rightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$  функция  $\chi(x) = e^{2\pi i \omega(x)}$  есть комплексный характер группы  $(M, +)$ , причём ведённое соответствие  $\omega \rightarrow \chi$  есть изоморфизм аддитивной группы рациональных характеров  $(M^*, +)$  и мультипликативной группы комплексных характеров группы  $(M, +)$ .

**Определение 9.2.** Комплексный характер  $\chi$  модуля  $M$  называется *различающим*, если  $\chi(K) \neq \{1\}$  для любого ненулевого подмодуля  $K \leq_{\mathcal{R}} M$ .

**Предложение 9.3.** Точный модуль  $\mathcal{R}M$  имеет различающий комплексный характер тогда и только тогда, когда он есть  $QF$ -модуль.

◀ Следует из теоремы 8.7. ▶

**Определение 9.4.** Весовые функции кодов  $\mathcal{C} \leq \mathcal{R}\mathcal{R}^N$  и  $\mathcal{K} = \text{ann}_{M^N}(\mathcal{C})$  связаны тождеством Мак-Вильямса, если существует комплексный характер  $\chi$  модуля  $M$  такой, что

$$W_{\mathcal{K}}(y_1, \dots, y_m) = \frac{1}{|\mathcal{C}|} W_{\mathcal{C}}(\rho_1^M(\mathbf{y}), \dots, \rho_r^M(\mathbf{y})), \quad (9.1)$$

где

$$\rho_j^M(\mathbf{y}) = \sum_{i=1}^m \chi(\rho_j \mu_i) y_i, \quad j = 1, \dots, r. \quad (9.2)$$

**Лемма 9.5.** Пусть  $\chi$  — различающий комплексный характер модуля  $\mathcal{R}M$ . Тогда для любого ненулевого подмодуля  $K \leq \mathcal{R}M$  справедливо равенство  $\sum_{\alpha \in K} \chi(\alpha) = 0$ .

◀ В силу конечности модуля  $M$ , группа  $G = \chi(K)$  как конечная подгруппа мультипликативной группы поля комплексных чисел является циклической. Следовательно,  $G$  совпадает с группой  $U_k$  корневой степени  $k$  из единицы для некоторого  $k \geq 2$ . По теореме Виета  $\sum_{u \in U_k} u = 0$ . Поэтому

$$\sum_{\alpha \in K} \chi(\alpha) = \frac{|K|}{|G|} \sum_{g \in G} g = 0.$$

▶

**Теорема 9.6.** Если  $\mathcal{R}M$  —  $QF$ -модуль и  $\chi$  — его различающий комплексный характер, то для любого линейного кода  $\mathcal{C} \leq \mathcal{R}\mathcal{R}^N$  справедливо тождество Мак-Вильямса (9.1). Если  $\mathcal{R}M$  — точный, но не  $QF$ -модуль, то существуют линейные коды  $\mathcal{C} \leq \mathcal{R}\mathcal{R}^N$  такие, что равенство (9.1) не выполняется ни для какого комплексного характера  $\chi$  модуля  $\mathcal{R}M$ .

◀ 1. Весовую функцию кода  $\mathcal{K} = \text{ann}_{M^N}(\mathcal{C})$  можно представить в виде

$$W_{\mathcal{K}}(y_1, \dots, y_m) = \sum_{\mathbf{a} \in \mathcal{K}} f(\mathbf{a}), \quad \text{где } f(\mathbf{a}) = y_1^{\sigma_1(\mathbf{a})} \dots y_m^{\sigma_m(\mathbf{a})}.$$

Для произвольного  $\mathbf{u} \in \mathcal{R}^N$  положим

$$\widehat{f}(\mathbf{u}) = \sum_{\mathbf{a} \in M^N} \chi(\mathbf{u}\mathbf{a})f(\mathbf{a}) \quad (9.3)$$

и свяжем функцию  $\widehat{f}$  с весовой функцией. Имеем

$$\sum_{\mathbf{u} \in \mathcal{C}} \widehat{f}(\mathbf{u}) = \sum_{\mathbf{u} \in \mathcal{C}} \left( \sum_{\mathbf{a} \in M^N} \chi(\mathbf{u}\mathbf{a})f(\mathbf{a}) \right) = \sum_{\mathbf{a} \in M^N} \left( \sum_{\mathbf{u} \in \mathcal{C}} \chi(\mathbf{u}\mathbf{a}) \right) f(\mathbf{a}).$$

Есть две возможности. Если  $\mathbf{a} \in \mathcal{K}$ , то  $\mathbf{u}\mathbf{a} = 0$  для всех  $\mathbf{u} \in \mathcal{C}$  и  $\chi(\mathbf{u}\mathbf{a}) = 1$ , откуда  $\sum_{\mathbf{u} \in \mathcal{C}} \chi(\mathbf{u}\mathbf{a}) = \sum_{\mathbf{u} \in \mathcal{C}} 1 = |\mathcal{C}|$ . Если  $\mathbf{a} \notin \mathcal{K}$ , то элементы вида  $\mathbf{u}\mathbf{a}$  образуют ненулевой подмодуль модуля  $M$ , откуда по лемме 9.5 получаем  $\sum_{\mathbf{u} \in \mathcal{C}} \chi(\mathbf{u}\mathbf{a}) = 0$ . Следовательно,

$$\sum_{\mathbf{u} \in \mathcal{C}} \widehat{f}(\mathbf{u}) = |\mathcal{C}| \sum_{\mathbf{a} \in \mathcal{K}} f(\mathbf{a}) = |\mathcal{C}| W_{\mathcal{K}}(y_1, \dots, y_m),$$

или

$$W_{\mathcal{K}}(y_1, \dots, y_m) = \frac{1}{|\mathcal{C}|} \sum_{\mathbf{u} \in \mathcal{C}} \widehat{f}(\mathbf{u}).$$

Далее преобразуем равенство (9.3), используя то, что  $\chi$  — гомоморфизм: для  $\mathbf{u} = (u_1, \dots, u_N)$ ,  $\mathbf{a} = (a_1, \dots, a_N)$  получаем

$$\widehat{f}(\mathbf{u}) = \sum_{a_1, \dots, a_N \in M} \left( \prod_{t=1}^N \chi(u_t a_t) \right) y_1^{\sigma_1(\mathbf{a})} \dots y_m^{\sigma_m(\mathbf{a})}.$$

Подставляя выражение

$$y_i^{\sigma_i(\mathbf{a})} = \prod_{t=1}^N y_i^{\sigma_i(a_t)},$$

делаем вывод, что

$$\widehat{f}(\mathbf{u}) = \sum_{a_1, \dots, a_N \in M} \left( \prod_{t=1}^N \chi(u_t a_t) y_1^{\sigma_1(a_t)} \dots y_m^{\sigma_m(a_t)} \right).$$

Заметим, что при  $a_t = \mu_\delta$  имеем  $y_1^{\sigma_1(a_t)} \dots y_m^{\sigma_m(a_t)} = y_\delta$ , поэтому

$$\widehat{f}(\mathbf{u}) = \sum_{\delta_1, \dots, \delta_N \in \{1, \dots, m\}} \left( \prod_{t=1}^N \chi(u_t \mu_{\delta_t}) y_{\delta_t} \right) = \prod_{t=1}^N \left( \sum_{\delta=1}^m \chi(u_t \mu_\delta) y_\delta \right).$$

Поскольку  $u_t$  принимает каждое значение  $\rho_\lambda$  ровно  $s_\lambda(\mathbf{u})$  раз,  $\lambda = 1, \dots, r$ , то окончательно получаем

$$\widehat{f}(\mathbf{u}) = \prod_{\lambda=1}^r \left( \sum_{\delta=1}^m \chi(\rho_\lambda \mu_\delta) y_\delta \right)^{s_\lambda(\mathbf{u})}.$$

Таким образом,  $\widehat{f}(\mathbf{u})$  получается из  $x_1^{s_1(\mathbf{u})} \dots x_r^{s_r(\mathbf{u})}$  заменой  $x_\lambda = \rho_\lambda^M(\mathbf{y})$ .

2. Построим контрпример для модуля, который не является квазифробениусовым. Положим  $N = 1$ ,  $\mathcal{C} = \mathcal{R}$ . В этом случае  $W_{\mathcal{C}}(x_1, \dots, x_r) = x_1 + \dots + x_r$ . Пусть  $M = \{\mu_1, \dots, \mu_m\}$ , где  $\mu_1 = 0$ . Из условия точности модуля  $M$  получаем, что  $\mathcal{K} = \text{ann}_M \mathcal{C} = 0$ , поэтому  $W_{\mathcal{K}}(y_1, \dots, y_m) = y_1$ .

Пусть  $\chi$  — произвольный комплексный характер  $\chi$  модуля  $M$ . Из условия, что  $M$  — не квазифробениусов, следует, что существует ненулевой подмодуль  $K < M$  такой, что  $\chi(K) = 1$ . Это означает, что множество  $X = \{\mu \in M : \chi(\mathcal{R}\mu) = 1\}$  содержит элементы из  $K$ , т.е.  $|X| = d \geq 2$ . Пусть без ограничения общности  $X = \{\mu_1, \dots, \mu_d\}$ . Тогда правая часть равенства (9.1) принимает вид

$$\begin{aligned} \frac{1}{|\mathcal{C}|} W_{\mathcal{C}}(\rho_1^M(\mathbf{y}), \dots, \rho_r^M(\mathbf{y})) &= \frac{1}{|\mathcal{R}|} (\rho_1^M(\mathbf{y}) + \dots + \rho_r^M(\mathbf{y})) = \\ &= \frac{1}{|\mathcal{R}|} \sum_{\lambda=1}^r \sum_{\delta=1}^m \chi(\rho_\lambda \mu_\delta) y_\delta = \frac{1}{|\mathcal{R}|} \sum_{\delta=1}^m \left( \sum_{\rho \in \mathcal{R}} \chi(\rho \mu_\delta) \right) y_\delta. \end{aligned}$$

При этом если  $\mu_\delta \in X$ , то  $\chi(\mathcal{R}\mu_\delta) = 1$ , и  $\sum_{\rho \in \mathcal{R}} \chi(\rho \mu_\delta) = |\mathcal{R}|$ . Если  $\mu_\delta \notin X$ , то  $\chi(\mathcal{R}\mu_\delta)$  — неединичная подгруппа мультипликативной группы поля комплексных чисел, и как и в лемме 9.5 имеем  $\sum_{\rho \in \mathcal{R}} \chi(\rho \mu_\delta) = 0$ .

Следовательно,

$$W_{\mathcal{C}}(\rho_1^M(\mathbf{y}), \dots, \rho_r^M(\mathbf{y})) = y_1 + \dots + y_d \neq y_1 = W_{\mathcal{K}}(\mathbf{y}),$$

т.е. равенство (9.1) не выполняется. ►

**1°. Линейные рекуррентные последовательности (ЛРП). Характеристический многочлен ЛРП. Порождающие элементы модуля ЛРП как модуля над кольцом коэффициентов.**

Пусть  $\Omega$  — произвольное множество.

**Определение 9.7.** Под *последовательностью* над  $\Omega$  мы будем понимать произвольную функцию  $u : \mathbb{Z}_+ \rightarrow \Omega$ . Для каждого  $i \in \mathbb{Z}_+$  элемент  $u(i)$  назовём  *$i$ -м членом* последовательности  $u$ . Множество всех последовательностей над  $\Omega$  обозначим через  $\Omega^\infty$ . Последовательность  $u \in \Omega^\infty$  можно также записывать в виде бесконечного вектора  $u = (u(0), u(1), \dots, u(i), \dots)$ .

Пусть  $\mathcal{R}$  — конечное коммутативное кольцо с  $1 \neq 0$ . Будем рассматривать последовательности над кольцом  $\mathcal{R}$ .

**Определение 9.8.** *Нулевую* последовательность  $(0, 0, \dots, 0, \dots)$  обозначим через  $(0)$ .

**Определение 9.9.** Последовательность  $u \in \mathcal{R}^\infty$  называется *линейной рекуррентной последовательностью* (или сокращённо *ЛРП*) *порядка*  $m > 0$  над  $\mathcal{R}$ , если существуют коэффициенты  $\beta_0, \dots, \beta_{m-1} \in \mathcal{R}$  такие, что

$$u(i+m) = \beta_{m-1}u(i+m-1) + \dots + \beta_1u(i+1) + \beta_0u(i) \quad \forall i \in \mathbb{Z}_+. \quad (9.4)$$

Соотношение (9.4) называют *законом рекурсии* ЛРП  $u$ , многочлен  $F(x) = x^m - \beta_{m-1}x^{m-1} - \dots - \beta_1x - \beta_0 \in \mathcal{R}[x]$  — её *характеристическим многочленом*, а вектор  $u(\overline{0, m-1}) = (u(0), \dots, u_{m-1}) \in \mathcal{R}^m$  — *начальным вектором* ЛРП  $u$ . По определению также считаем, что нулевая последовательность  $(0)$  — ЛРП порядка 0 с характеристическим многочленом  $F(x) = 1$ , и  $(0)$  — единственная ЛРП порядка 0.

*Примеры.*

1. Геометрическая прогрессия  $u = (a, aq, aq^2, \dots, aq^i, \dots)$ ,  $a, q \in \mathcal{R}$ ,  $a \neq 0$ , есть ЛРП порядка 1 с характеристическим многочленом  $x - q$  и начальным вектором  $u(\overline{0}) = (a)$ .
2. Арифметическая прогрессия  $u \in \mathcal{R}^\infty$  с общим членом  $u(i) = a + di$ ,  $i \in \mathbb{Z}_+$ , где  $a, d \in \mathcal{R}$ ,  $d \neq 0$ , есть ЛРП порядка 2 с характеристическим многочленом  $x^2 - 2x + 1$  и начальным вектором  $u(\overline{0, 1}) = (a, a + d)$ .
3. Последовательность Фибоначчи  $f \in \mathcal{R}^\infty$  с  $f(0) = f(1) = 1$  и законом рекурсии  $u(i+2) = u(i+1) + u(i)$  есть ЛРП порядка 2 с характеристическим многочленом  $x^2 - x - 1$  и начальным вектором  $u(\overline{0, 1}) = (1, 1)$ .

**Определение 9.10.** Определим сумму  $u + v$  последовательностей  $u, v \in \mathcal{R}^\infty$  как последовательность  $w \in \mathcal{R}^\infty$ , заданную правилом  $w(i) = u(i) + v(i)$ ,  $i \in \mathbb{Z}_+$ . Определим произведение  $ru$  последовательности  $u \in \mathcal{R}^\infty$  на число  $r \in \mathcal{R}$  как последовательность  $z \in \mathcal{R}^\infty$ , заданную правилом  $z(i) = ru(i)$ ,  $i \in \mathbb{Z}_+$ .

Очевидно, что эти операции задали на  $\mathcal{R}^\infty$  структуру левого  $\mathcal{R}$ -модуля, а если  $\mathcal{R}$  — поле, то структуру бесконечномерного линейного пространства.

Для фиксированного унитарного многочлена  $F(x) = x^m - \beta_{m-1}x^{m-1} - \dots - \beta_1x - \beta_0 \in \mathcal{R}[x]$  степени  $m \geq 0$  через  $L_{\mathcal{R}}(F)$  обозначим множество всех ЛРП над  $\mathcal{R}$  с характеристическим многочленом  $F(x)$ .

**Предложение 9.11.** Произвольная ЛРП  $u \in L_{\mathcal{R}}(F)$  однозначно задаётся своим начальным вектором  $u(\overline{0, m-1})$ , при этом  $|L_{\mathcal{R}}(F)| = |\mathcal{R}|^m$ .

◀ Следует непосредственно из определения ЛРП. ▶

**Предложение 9.12.**  $L_{\mathcal{R}}(F)$  является конечным подмодулем модуля  ${}_{\mathcal{R}}\mathcal{R}^\infty$ .

◀ Следует из определений ЛРП, суммы последовательностей и произведения последовательности на число, и предыдущего предложения. ▶

Таким образом,  ${}_{\mathcal{R}}L_{\mathcal{R}}(F)$  как конечный модуль будет и конечно порождённым модулем. В следующем утверждении мы найдём минимальную мощность его системы образующих и дадим описание базисов этого модуля.

**Предложение 9.13.** 1.  $L_{\mathcal{R}}(F)$  является свободным  $\mathcal{R}$ -модулем ранга  $m$ .

2. Система элементов  $u_1, \dots, u_m \in L_{\mathcal{R}}(F)$  есть базис (т.е. линейно независимая над  $\mathcal{R}$  система образующих) модуля  $L_{\mathcal{R}}(F)$  тогда и только тогда, когда матрица

$$U = \begin{pmatrix} u_1(\overline{0, m-1}) \\ \vdots \\ u_m(\overline{0, m-1}) \end{pmatrix},$$

составленная из начальных векторов этих последовательностей, обратима над кольцом  $\mathcal{R}$ .

◀ 1. Согласно предложению 6.36, нам достаточно показать, что у  $L_{\mathcal{R}}(F)$  есть базис мощности  $m$ . Это утверждение будет следовать из пункта 2, поскольку над  $\mathcal{R}$  существуют обратимые матрицы, например, единичная матрица  $E_m$ .

2. “ $\Leftarrow$ ” Пусть  $U$  — обратимая матрица. Тогда для любой строки  $\mathbf{a} \in \mathcal{R}^m$  существует единственный набор коэффициентов  $(b_1, \dots, b_m) \in \mathcal{R}^m$  такой, что  $\mathbf{a} = (b_1, \dots, b_m)U$ . В частности, для произвольной последовательности  $u \in L_{\mathcal{R}}(F)$  существует единственный набор коэффициентов  $(c_1, \dots, c_m) \in \mathcal{R}^m$  такой, что

$$u(\overline{0, m-1}) = (c_1, \dots, c_m)U. \quad (9.5)$$

Рассмотрим последовательность  $v = c_1u_1 + \dots + c_mu_m \in L_{\mathcal{R}}(F)$ . По построению  $v(\overline{0, m-1}) = (c_1, \dots, c_m)U = u(\overline{0, m-1})$ . Значит, согласно предложению 9.11,  $v = u$ , т.е.  $u = c_1u_1 + \dots + c_mu_m$ . Единственность такого представления следует из единственности решения уравнения (9.5).

“ $\Rightarrow$ ” Пусть система элементов  $u_1, \dots, u_m \in L_{\mathcal{R}}(F)$  есть базис модуля  $L_{\mathcal{R}}(F)$ . Определим для каждого  $k = 1, \dots, m$  ЛРП  $e_k^F \in \mathcal{L}_{\mathcal{R}}(F)$  начальным вектором  $e_k^F(\overline{0, m-1}) = e_k$  с 1 на  $k$ -м месте и нулями на остальных. По предположению каждая из последовательностей  $e_k^F \mathcal{L}_{\mathcal{R}}(F)$  представляется в виде

$$e_k^F = c_{k1}u_1 + \dots + c_{km}u_m.$$

Тогда для  $m \times m$  матрицы  $C = (c_{ij})$  выполнено соотношение

$$CU = \begin{pmatrix} e_1^F(\overline{0, m-1}) \\ \vdots \\ e_m^F(\overline{0, m-1}) \end{pmatrix} = E_m.$$

Следовательно,  $U$  — обратимая матрица. ▶

**Следствие 9.14.** Система ЛРП  $e_k^F \in \mathcal{L}_{\mathcal{R}}(F)$ ,  $k = 1, \dots, m$ , есть базис модуля  $L_{\mathcal{R}}(F)$ .

**Следствие 9.15.** Если  $\mathcal{R} = \mathbb{F}$  — поле, то  $\dim L_{\mathbb{F}}(F) = \deg F(x)$ .

**2°. Пространство последовательностей над кольцом как модуль над кольцом многочленов. Импульсная последовательность. Генератор ЛРП.** Покажем, что на множестве  $\mathcal{R}^\infty$  можно задать структуру  $\mathcal{R}[x]$ -модуля, которая даст ещё более “экономный” способ задания модуля  $L_{\mathcal{R}}(F)$ .

**Определение 9.16.** Для произвольного  $k \in \mathbb{Z}_+$  определим *произведение*  $x^k \cdot u$  и *последовательности*  $u \in \mathcal{R}^\infty$  на *одночлен*  $x^k \in \mathcal{R}[x]$  как последовательность  $v \in \mathcal{R}^\infty$ , заданную правилом

$$v(i) = u(i + k), \quad i \in \mathbb{Z}_+.$$

Другими словами, умножение на одночлен  $x^k$  есть сдвиг последовательности  $u$  на  $k$  шагов влево, либо вычёркивание из  $u$  первых  $k$  членов:

$$x^k \cdot (u(0), u(1), \dots) = (u(k), u(k + 1), \dots).$$

**Определение 9.17.** Определим *произведение*  $A(x) \cdot u$  и *последовательности*  $u \in \mathcal{R}^\infty$  на *многочлен*  $A(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0 \in \mathcal{R}[x]$  как последовательность, заданную правилом

$$A(x) \cdot u = a_n(x^n \cdot u) + \dots + a_1(x \cdot u) + a_0 u,$$

т.е.  $A(x) \cdot u = w$ , где

$$w(i) = \sum_{k=0}^n a_k u(i + k) \tag{9.6}$$

для всех  $i \in \mathbb{Z}_+$ .

**Предложение 9.18.** Для произвольного унитарного многочлена  $F(x) \in \mathcal{R}[x]$  имеет место равенство

$$L_{\mathcal{R}}(F) = \{u \in \mathcal{R}^\infty : F(x) \cdot u = (0)\}.$$

◀ Если  $F(x) = 1$ , то по определению порядка ЛРП имеем  $L_{\mathcal{R}}(F) = \{(0)\} = \{u \in \mathcal{R}^\infty : 1 \cdot u = (0)\}$ . Пусть  $\deg F(x) = m > 0$ . Тогда для  $u \in \mathcal{R}^\infty$ , согласно равенству (9.6), имеем  $F(x) \cdot u = v$ , где  $v(i) = u(i + m) - \beta_{m-1} u(i + m - 1) - \dots - \beta_0 u(i)$  для  $i \in \mathbb{Z}_+$ . Поэтому согласно закону рекурсии (9.4), условие  $u \in L_{\mathcal{R}}(F)$  равносильно условию  $F(x) \cdot u = (0)$ . ▶

**Теорема 9.19.** Группа  $(\mathcal{R}^\infty, +)$  является  $\mathcal{R}[x]$ -модулем относительно введённой операции умножения последовательности на многочлен.

◀ Проверим выполнение аксиом.

1. Пусть  $A(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k \in \mathcal{R}[x]$ ,  $u, v \in \mathcal{R}^\infty$ . Тогда

$$\begin{aligned} A(x) \cdot (u + v) &= \sum_{k=0}^n a_k (x^k \cdot (u + v)) = \\ &= \sum_{k=0}^n a_k (x^k \cdot u + x^k \cdot v) = A(x) \cdot u + A(x) \cdot v. \end{aligned}$$

Аналогично,  $(A(x) + B(x)) \cdot u = A(x) \cdot u + B(x) \cdot u$  для любых  $A(x), B(x) \in \mathcal{R}[x]$ ,  $u \in \mathcal{R}^\infty$ .

2. По определению  $1 \cdot u = u$  для всех  $u \in \mathcal{R}^\infty$ .

3. Осталось проверить, что  $(A(x)B(x)) \cdot u = A(x) \cdot (B(x) \cdot u)$  для любых  $A(x), B(x) \in \mathcal{R}[x]$ ,  $u \in \mathcal{R}^\infty$ . Для одночленов имеем:

$$\begin{aligned} ax^k \cdot (bx^l \cdot u) &= ax^k \cdot (bu(l), bu(l+1), \dots) = \\ &= (abu(k+l), abu(k+l+1), \dots) = abx^{k+l} \cdot u. \end{aligned}$$

Поэтому для  $A(x) = \sum_{k \geq 0} a_k x^k$ ,  $B(x) = \sum_{l \geq 0} b_l x^l$  получаем, что

$$\begin{aligned} (A(x)B(x)) \cdot u &= \left( \sum_{k, l \geq 0} a_k b_l x^{k+l} \right) \cdot u = \sum_{k, l \geq 0} a_k x^k \cdot (b_l x^l \cdot u) = \\ &= \sum_{k \geq 0} a_k x^k \cdot (B(x) \cdot u) = A(x) \cdot (B(x) \cdot u). \end{aligned}$$

►

**Следствие 9.20.**  $L_{\mathcal{R}}(F)$  является подмодулем модуля  ${}_{\mathcal{R}[x]}\mathcal{R}^\infty$ .

◀ Если  $u \in L_{\mathcal{R}}(F)$  и  $A(x) \in \mathcal{R}[x]$ , то  $F(x) \cdot (A(x) \cdot u) = (F(x)A(x)) \cdot u = A(x) \cdot (F(x) \cdot u) = A(x) \cdot (0) = (0)$ . Следовательно,  $A(x) \cdot u \in L_{\mathcal{R}}(F)$ .

►

Следующая теорема показывает, что  $\mathcal{R}[x]$ -модуль  $L_{\mathcal{R}}(F)$  является циклическим, т.е. для его задания достаточно одной последовательности.

**Теорема 9.21.** Пусть  $F(x) = x^m - \beta_{m-1}x^{m-1} - \dots - \beta_1x - \beta_0 \in \mathcal{R}[x]$ ,  $m > 0$ . Через  $e^F \in L_{\mathcal{R}}(F)$  обозначим ЛРП с начальным вектором

$e_m = (0, \dots, 0, 1)$ . Тогда для любой последовательности  $u \in L_{\mathcal{R}}(F)$  существует единственный многочлен  $\Phi(x) \in \mathcal{R}[x]$  степени  $\deg \Phi(x) < m$  такой, что  $u = \Phi(x) \cdot e^F$ , имеющий вид

$$\Phi(x) = u(0)x^{m-1} + \sum_{k=1}^{m-1} (u(k) - \beta_{m-1}u(k-1) - \dots \\ \dots - \beta_{m-k}u(0))x^{m-1-k}. \quad (9.7)$$

◀ Система ЛРП  $e^F, x \cdot e^F, \dots, x^{m-1} \cdot e^F \in L_{\mathcal{R}}(F)$  есть базис  $\mathcal{R}$ -модуля  $L_{\mathcal{R}}(F)$  по предложению 9.13, поскольку матрица, составленная из начальных векторов этих последовательностей, имеет вид

$$U = \begin{pmatrix} e^F(\overline{0, m-1}) \\ x \cdot e^F(\overline{0, m-1}) \\ \vdots \\ x^{m-1} \cdot e^F(\overline{0, m-1}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^F(\overline{0, m-1}) \\ e^F(\overline{1, m}) \\ \vdots \\ e^F(\overline{m-1, 2m-2}) \end{pmatrix} = \\ = \begin{pmatrix} 0 & \dots & \dots & 0 & 1 \\ 0 & \dots & \dots & 1 & e^F(m) \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & e^F(m) & \dots & \dots & e^F(2m-2) \end{pmatrix},$$

следовательно, обратима над  $\mathcal{R}$ . Таким образом, существует единственный набор коэффициентов  $\varphi_0, \dots, \varphi_{m-1} \in \mathcal{R}$  такой, что  $u = \varphi_0 e^F + \varphi_1 x \cdot e^F + \dots + \varphi_{m-1} x^{m-1} e^F$ . Отсюда очевидно следует, что  $\Phi(x) = \varphi_0 + \varphi_1 x + \dots + \varphi_{m-1} x^{m-1}$  — искомый многочлен, и что он единственен.

Осталось вывести формулу (9.7). По построению коэффициенты многочлена  $\Phi(x)$  удовлетворяют равенству  $(\varphi_0, \dots, \varphi_{m-1}) = u(\overline{0, m-1})U^{-1}$ . Значит, нам достаточно доказать, что обратной для  $U$  является матрица

$$V = \begin{pmatrix} -\beta_1 & -\beta_2 & \dots & -\beta_{m-1} & 1 \\ -\beta_2 & -\beta_3 & \dots & 1 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ -\beta_{m-1} & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 0 & \dots & \dots & 0 \end{pmatrix}.$$

Рассмотрим произведение строки  $\vec{v}_s$  матрицы  $V$  на столбец  $u_t^\downarrow$  матрицы  $U$ . Имеем  $\vec{v}_s = (-\beta_s, \dots, -\beta_{m-1}, 1, 0, \dots, 0)$ , единица рас-

положена на месте  $m - s + 1$ ;  $u_t^\downarrow = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ e^F(m) \\ \vdots \\ e^F(m+t-2) \end{pmatrix}$ , единица рас-

положена на месте  $m - t + 1$ . Из расположения нулей и единиц в этих векторах сразу видно, что  $\vec{v}_s u_t^\downarrow = 0$ , если 1 в  $u_t^\downarrow$  расположена ниже позиции  $m - s + 1$ , т.е. при всех  $t < s$ ; и  $\vec{v}_s u_t^\downarrow = 1$ , если 1 в  $u_t^\downarrow$  расположена в точности на месте  $m - s + 1$ , т.е. при  $t = s$ . Пусть теперь  $t \geq s + 1$ . Имеем

$$\begin{aligned} \vec{v}_s u_t^\downarrow &= -\beta_s e^F(t-1) - \beta_{s+1} e^F(t) - \dots \\ &\quad \dots - \beta_{m-1} e^F(t+m-s-2) + e^F(t+m-s-1), \end{aligned}$$

откуда, подставляя  $j = t - s - 1$  ( $j \geq 0$  по условию на  $t$  и  $s$ ), получаем

$$\vec{v}_s u_t^\downarrow = e^F(j+m) - \beta_{m-1} e^F(j+m-1) - \dots - \beta_s e^F(j+s).$$

Поскольку по определению  $e^F(i) = 0$  при  $i < m$ , и  $j + s = t - 1 < m$ , и в выражение для  $\vec{v}_s u_t^\downarrow$  можно добавить нулевые слагаемые, то окончательно получим

$$\begin{aligned} \vec{v}_s u_t^\downarrow &= e^F(j+m) - \beta_{m-1} e^F(j+m-1) - \dots \\ &\quad \dots - \beta_s e^F(j+s) - \beta_{s-1} e^F(j+s-1) - \dots - \beta_0 e^F(j). \end{aligned}$$

Правая часть этого равенства обращается в 0, поскольку  $e^F$  есть ЛРП с характеристическим многочленом  $F(x)$ . Таким образом,  $\vec{v}_s u_t^\downarrow = 0$ . Следовательно,  $VU = E_m$ . ►

**Определение 9.22.** Последовательность  $e^F \in L_{\mathcal{R}}(F)$  называется *импульсной последовательностью*. Многочлен  $\Phi(X)$ , определённый равенством (9.7), называется *генератором ЛРП и относительно её характеристического многочлена  $F(x)$* .

Пусть  $\mathcal{R}$  — конечное коммутативное кольцо с  $1 \neq 0$ .

### 3°. Минимальный многочлен ЛРП над полем и его свойства. Аннулятор ЛРП.

Для фиксированного унитарного многочлена  $F(x) = x^m - \beta_{m-1}x^{m-1} - \dots - \beta_1x - \beta_0 \in \mathcal{R}[x]$  степени  $m \geq 0$  как и ранее через  $L_{\mathcal{R}}(F)$  будем обозначать множество всех ЛРП над  $\mathcal{R}$  с характеристическим многочленом  $F(x)$ .

**Предложение 9.23.** Любая ЛРП  $u \in L_{\mathcal{R}}(F)$  имеет бесконечно много характеристических многочленов.

◀ Поскольку  $L_{\mathcal{R}}(F)$  является подмодулем модуля  $\mathcal{R}[x]\mathcal{R}^{\infty}$ , то любой унитарный многочлен  $H(x) \in \mathcal{R}[x] \cdot F(x)$  является характеристическим для  $u$ . ▶

**Определение 9.24.** Минимальным многочленом ЛРП  $u$  называется её характеристический многочлен, имеющий наименьшую степень. Степень минимального многочлена называется рангом ЛРП  $u$ .

Из этого определения видно, что ранг  $u$  определён однозначно, поэтому корректно использовать обозначение  $\text{rku}$ . В то же время, ЛРП над кольцом может иметь несколько минимальных многочленов.

*Пример.*

Геометрическая прогрессия  $u = (a, aq, aq^2, \dots, aq^i, \dots)$  при  $a \neq 0$  есть ЛРП ранга 1, соответственно, её характеристический многочлен  $F(x) = x - q$  является её минимальным многочленом. Возьмём делитель нуля  $a \in \mathcal{R}$  и любой элемент  $b \in \mathcal{R}$ ,  $b \neq 0$ , такой, что  $ab = 0$ . В этом случае минимальным многочленом для  $u$  будет также многочлен  $F(x) + b$ .

Отметим, что в этом примере кольцо  $\mathcal{R}$  содержит делители нуля, т.е. не может быть полем. Докажем общее утверждение, что для ЛРП над полем минимальный многочлен всегда определён однозначно.

**Определение 9.25.** Аннулятором последовательности  $u \in \mathcal{R}^{\infty}$  называется множество

$$\text{ann}(u) = \{H(x) \in \mathcal{R}[x] : H(x) \cdot u = 0\}.$$

Заметим некоторые очевидные свойства аннулятора последовательности:

- Предложение 9.26.** 1.  $\text{ann}(u)$  является идеалом кольца  $\mathcal{R}[x]$ ;  
 2.  $u \in \mathcal{R}^\infty$  является ЛРП над  $\mathcal{R}$  тогда и только тогда, когда  $\text{ann}(u)$  содержит унитарный многочлен;  
 3. Минимальным многочленом ЛРП  $u$  является любой унитарный многочлен наименьшей степени из  $\text{ann}(u)$ .

**Теорема 9.27.** Любая ЛРП  $u$  над полем  $\mathbb{F}$  имеет единственный минимальный многочлен  $M_u(x) \in \mathbb{F}[x]$ . Кроме того, он удовлетворяет равенству

$$\text{ann}(u) = \mathbb{F}[x]M_u(x),$$

т.е. является образующим элементом идеала  $\text{ann}(u)$ , и соответственно, делит все характеристические многочлены ЛРП  $u$ .

◀ Известно, что  $\mathbb{F}[x]$  — кольцо главных идеалов, поэтому  $\text{ann}(u) = \mathbb{F}[x]G(x)$ . Среди всех таких многочленов  $G(x)$  существует единственный унитарный многочлен, обозначим его  $M_u(x)$ . Поскольку  $M_u(x) \cdot u = (0)$ , то многочлен  $M_u(x)$  является характеристическим многочленом ЛРП  $u$ . По построению  $M_u(x)$  делит все остальные характеристические многочлены ЛРП  $u$ , следовательно, он является её минимальным многочленом. Единственность характеристического многочлена данной степени уже доказана, что влечёт единственность минимального многочлена. ▶

В общем случае кольцо многочленов над кольцом  $\mathcal{R}$  не обладает всеми свойствами кольца многочленов над полем. Например, из-за наличия необратимых элементов в кольце  $\mathcal{R}$  к многочленам над  $\mathcal{R}$  нельзя применить алгоритм деления столбиком даже в случае многочленов 0 степени. С другой стороны, в частном случае унитарного многочлена  $G(x)$  алгоритм деления с остатком на  $G(x)$  применим. Сохраняются понятия делимости многочленов и взаимной простоты:

**Определение 9.28.** Многочлены  $F(x), G(x) \in \mathcal{R}[x]$  назовём *взаимно простыми* и обозначим  $(F(x), G(x)) = 1$ , если  $\mathcal{R}[x]F(x) + \mathcal{R}[x]G(x) = \mathcal{R}[x]$ , т.е.  $A(x)F(x) + B(x)G(x) = 1$  для некоторых  $A(x), B(x) \in \mathcal{R}[x]$ .

**Предложение 9.29.** Для любых многочленов  $F(x), G(x), H(x) \in \mathcal{R}[x]$  справедливы следующие утверждения:

1. если  $(F(x), G(x)) = 1$  и  $(F(x), H(x)) = 1$ , то  $(F(x), G(x)H(x)) = 1$ ;
2. если  $(F(x), G(x)) = 1$  и  $F(x)|(G(x)H(x))$ , то  $F(x)|H(x)$ ;
3. если  $(F(x), G(x)) = 1$ ,  $F(x)|H(x)$  и  $G(x)|H(x)$ , то  $F(x)G(x)|H(x)$ .

◀ Доказывается так же как и для многочленов над полем. ▶

### Задачи к лекции 9.

**Задача 1.** Рассмотрите, как выглядит тождество Мак-Вильямс в случае, когда  $\mathcal{R} = \mathbb{F}_q$  — конечное поле,  $\mathcal{C}$  — линейный код над  $\mathbb{F}_q$  длины  $n$ ,  $\mathcal{K} = \mathcal{C}^\circ$ .

**Задача 2.** Пусть  $\mathcal{R} = \mathbb{Z}_4$ . Рассмотрим линейный код  $\mathcal{C}$  над  $\mathcal{R}$  с порождающей матрицей  $G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ . Пусть  $M = \mathcal{R}^* - QF$ -модуль. Найдите весовые функции кодов  $\mathcal{C} \leq_{\mathcal{R}} \mathcal{R}^N$  и  $\mathcal{K} = \text{ann}_{M^N}(\mathcal{C})$ . Укажите комплексный характер  $\chi$  модуля  $M$  такой, что выполнено тождество Мак-Вильямс. Тождество запишите явно для указанных кодов и характера.

**Задача 3.** Пусть  $\mathcal{R} = \mathbb{Z}_6$ ,  $F(x) = x^4 - x - 1$ . Для каких  $y \in \mathbb{Z}_6$  ЛРП  $u_1, u_2, u_3, u_4 \in L_{\mathcal{R}}(F)$  с начальными векторами  $(0, 1, 2, 3), (1, 0, 0, 0), (2, 2, 1, 1), (2, y, 0, 3)$  составляют базис  $\mathcal{R}$ -модуля  $L_{\mathcal{R}}(F)$ ?

**Задача 4.** Найдите генератор ЛРП  $u$  над  $\mathbb{Z}_3$  с характеристическим многочленом  $F(x) = x^7 + x^5 + x^3 + 2x + 2$  и начальным вектором  $(0, 1, 2, 0, 0, 1, 1)$ .

**Задача 5.** Найдите генератор ЛРП  $u$  над  $\mathbb{Z}_4$  с характеристическим многочленом  $F(x) = x^7 + x^6 + 2x^3 + 2x + 1$  и начальным вектором  $(0, 0, 1, 2, 0, 1, 1)$ .

**Задача 6.** Сколько минимальных многочленов имеет геометрическая прогрессия  $u$  с  $u(0) = 4$  и  $q = 3$  над кольцом  $\mathbb{Z}_{16}$ ?

## Список литературы

- [1] М.М. Глухов, В.П. Елизаров, А.А. Нечаев. Алгебра, т. 1,2. Изд. “Гелиос АРВ”, М., 2003.
- [2] В.Л. Куракин, А.А. Нечаев. Линейные коды и полилинейные рекурренты.
- [3] Р. Лидл, Г. Нидеррайтер. Конечные поля, т. 1,2. Изд. “Мир”, М., 1988.
- [4] В.Т. Марков, Конспект спецкурса “Теория колец” 2016/2017 учебного года. Тема «Кольца и модули в теории кодирования». <http://halgebra.math.msu.su/wiki/doku.php/specialcourses:ringtheory>
- [5] А.А. Нечаев. Конечные квазифробениусовы модули, приложения к кодам и линейным рекуррентам// *Фундаментальная и прикладная математика*, 1995, Т.1, № 1, 229-254.